

GENETTI ECO

roślinny
kompatybilny
z produktami
organicznymi

rolnictwo
ekologiczne

| info@genettieco.com

Spis treści

4	OXI CUP 500
5	OXI CUP 300
6	AGRI-KELP
7	ALGA-MIN
8	AMINAGRON
9	ATS TOP 15
10	ATS TOP KRISTALL 98
11	BOTRIFEND
12	CHEL-CUP EDTA 15
13	CHEL-FERR EDDHA 6
14	CHEL-FERR EDTA 13
15	CHEL-MAN EDTA 13
16	CHEL-ZINC EDTA 15
17	ENKA-PHOS
18	FERTIGOLD
19	HUMIPLUS 16
20	HUMIPLUS MICRO
21	HYDRO 46
22	KAOLIN 100
23	FOAM-FREE
24	SULFOCUP 20
25	TECNO CUP 6
26	NEO CAL
27	ZEOVITAN
28	ZEOVITAN-LEAF
29	FOSFOGEN
30	SORBWATER
31	FRUIT-RED ECO
32	HARP-X
33	TANNECO 34
34	WATERSTOPBARRIERA
35	FROST AID CANDLE ANTI-FROST
36	CLEANECO
37	UWAGI...

Nawóz WE

Tlenochlorek miedzi

Całkowita zawartość miedzi

(Cu).....50% Używać wyłącznie w przypadku rzeczywistej potrzeby

Nie przekraczać wskazanych dawek.

Zatwierdzony dla rolnictwa organicznego

Substancja aktywna: tlenochlorek miedzi

NIE NALEŻY STOSOWAĆ PODCZAS KWITNIENIA: MIESZALNOŚĆ:

Nie mieszać z produktami o odczynie zasadowym. Przed zmieszaniem ze środkami ochrony roślin lub nawozami zawsze należy przeprowadzić test zgodności.

UTYLIZACJA:

Opakowanie, po jego całkowitym opróżnieniu należy zanieść do punktu recyklingu. Nie wykorzystywać ponownie opakowań do jakichkolwiek innych celów. Opakowania zawierające pozostałości produktu należy dostarczyć do punktów zbiórki chemii gospodarczej.

Po zużyciu należy zutylizować opakowanie w ekologiczny sposób.

Sposób użycia:

Warunki stosowania i liczba zastosowań dla wszystkich zabiegów - nie należy przekraczać całkowitej liczby sugerowanych zabiegów.

Przestrzegać zalecanej ilości zabiegów/dawek dostosowanej do fazy wzrostu.

Produkt służy do nawożenia dolistnego.

Uprawy owoców (jabłko, gruszką, brzoskwinia, wiśnia, morela, śliwka): 0,1 kg - 0,5 kg/100 l wody

Ziemniaki: 0,5 kg - 2,0 kg/ha w maks. 400 l wody

Chmiel: 2,4 kg - 5,4 kg/ha w 1200 l - 2700 l wody/ha

Winogrona do produkcji wina: 0,5 kg - 2,0 kg/ha w 400 l - 1 600 l wody/ha

Oliwki: 1,2 - 1,8 kg/ha w 500 - 700 l wody

Truskawki i rośliny ogrodowe, w tym koper włoski:

1,3 - 1,9 kg/ha w 500 - 700 l wody

Uprawy polowe (buraki, zboża, ryż, tytoń):

0,7 - 1,2 kg/ha w 400 - 600 l wody

UWAGA!

Zawiera: tlenochlorek miedzi (numer indeksu 029-017-00-1)

Działa szkodliwie w następstwie wdychania. H312 Działa szkodliwie

w kontakcie ze skórą. H302: Działa szkodliwie po połknięciu. H314

Powoduje poważne podrażnienie skóry i poważne uszkodzenie oczu.

P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280 Stosować rękawice ochronne/-

odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG

ODDECHOWYCH:

Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do

swobodnego oddychania. P301 + P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

P405 Przechowywać pod zamknięciem. Nie wyrzucać pojemnika do środowiska

Producent:

GENETTI ECO S.R.L.S. - 01767/16

Via Goldegg 2, 39011 Lana | info@genettieco.com

10Kg

NAWÓZ WE

Tlenochlorek miedzi - 22% = 300 g/l (Cu)

Stosować wyłącznie w przypadku rzeczywistej potrzeby.

Nie przekraczać zalecanej dawki.

Utylizacja: Opakowanie, po jego całkowitym opróżnieniu należy zanieść do punktu recyklingu. Nie wykorzystywać ponownie opakowań do jakichkolwiek innych celów. Odnieść opakowania zawierające jakiekolwiek pozostałości produktu do punktu zbiórki odpadów problematycznych.

Mieszalność: Oxycup 300 jest mieszalny z powszechnie stosowanymi środkami ochrony roślin. W związku z faktem, że nie jest możliwe przewidzenie wszystkich nieprzewidzianych okoliczności zaleca się przeprowadzenie testu mieszania z małymi ilościami produktów przeznaczonych do natryskiwania.

Uwagi ogólne: Zaopatrzenie w składniki odżywcze z miedzią, przy niskim poziomie niedoboru miedzi 0,15 kg/ha, przy średnim niedoborze 0,3 kg/ha, przy dużym niedoborze 0,5 kg/ha rozpuszczone w 200-400 l wody/ha.

Burak cukrowy: 0,25 l/ha od fazy 2 liści do fazy 2-giego węzła.

Winogrona do produkcji wina: 2-4 razy 0,25 kg/ha - 0,50 kg/ha kilka razy od fazy 3 liści do zamknięcia gron.

Zboża: 0,25 kg/ha - 0,50 kg/ha od fazy 2 liści do fazy węzłowej. 200-400 l/ha dla twardości, stabilności, wydajności.

Rzepak ozimy: 0,25 kg/ha - 0,50 kg/ha raz od fazy 2 liści do stadium pąka w celu zapewnienia wydajności.

Kukurydza: 0,25 kg/ha - 0,50 kg/ha od fazy 4 liści dla uzyskania jakości oraz wydajności.

Ziemniaki: 0,25 kg/ha - 0,50 kg/ha aż do ostatniego oprysku przeciwko zarazie w celu zapewnienia wydajności.

Owoce ziarnkowe i pestkowe: 0,20 kg/ha - 0,50 kg/ha w celu zapewnienia wydajności.

Uprawy warzyw (szparagi, ogórki, marchew, cebula): 0,25 kg/ha - 0,50 kg/ha w celu zapewnienia wydajności.

Użytki zielone: 1-3 razy 0,25-0,75 l/ha dla odporności, wydajności.

Burak cukrowy: 0,25 l/ha od fazy 4-6 liści

Warzywa i kapusta: 1-2 razy 0,25 l/ha po uzyskaniu dostatecznej masy liściowej

Przyprawy i rośliny lecznicze: 1-2 razy 0,25 l/ha po uzyskaniu dostatecznej masy liściowej

UWAGA!

Zawiera: Tlenochlorek miedzi (numer indeksu 029-017-00-1)

Działa szkodliwie w następstwie wdychania. H312 Działa szkodliwie w

kontakcie ze skórą. H302: Działa szkodliwie po połknięciu. H314

Powoduje poważne podrażnienie skóry i poważne uszkodzenie oczu.

P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280 Stosować rękawice

ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P304 + P340

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:

Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i

zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P301 + P312 W

PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z

OSRODKIEM ZATRUCI lub lekarzem.

P405 Przechowywać pod zamknięciem.



Nie wyrzucać pojemnika do środowiska

Producent:

GENETTI ECO S.R.L.S. - 01767/16

Via Goldegg 2, 39011 Lana | info@genettieco.com 12,5 L-10 K

Eco Agri-kelp

Bioaktywator WE do rzepaku, warzyw, owoców

Szkółki drzewek EuVoc Agri Kelp to bioaktywator o sprawdzonej skuteczności do stosowania dolistnego oraz do zanurzania. Koncentrat uzyskany z alg gatunku *Ecklonia maxima* jest delikatnie ekstrahowany za pomocą opatentowanego procesu. W ten sposób, istotne zawartości komórki

zostają zachowane. Specjalny skład naturalnie występujących aminokwasów, białek, pierwiastków śladowych i innych substancji ważnych dla wzrostu czynią

EuVoc Agri Kelp wyjątkowym. EuVoc Agri Kelp dobitnie udowodnił swoją skuteczność w setkach prób.

EuVoc Agri Kelp wspomaga formowanie drobnych korzeni, a tym samym pozwala roślinie wykształcić większy potencjał odżywczy.

EuVoc Agri Kelp wzmacnia rośliny uprawne i zapewnia wyższe plony o lepszej jakości.

Zastosowanie i dawkowanie

W wielu eksperymentach EuVoc Agri Kelp wykazał imponującą swoją skuteczność: Niewielki wysiłek - wyższe plony - silne oddziaływanie. Rzepak/lepsza zimoodporność - intensywniejsze formowanie drobnych korzeni - Szybki rozwój upraw - lepsze zaopatrzenie w substancje odżywcze. Zwłaszcza w uprawach rzepaku, warzyw i owoców, a także w uprawach szkółek drzewnych, znacznie poprawiono wzrost korzeni, wyższą vitalność i odporność, w szkółkach drzewnych zmniejszono straty w transplantacjach oraz osiągnięto pożądane rozmiary roślin w krótszym czasie.

Zboża

Na wiosnę, na początku wegetacji 2 l/ha Agri Kelp zmieszane z 200 do 300 l wody - lepsze formowanie się korzeni, większe plony

Ziemniaki W słabo zakorzenionych odmianach 2 l Agri Kelp rozpuszczone w 80 l wody, podczas sadzenia (w połączeniu z zaprawianiem) do zamknięcia początkowych rzędów, 2 l/ha Agri Kelp z 400 l wody - w zaawansowanej fazie rozwoju bulw, lepszy wzrost, bardziej vitalne uprawy, większa odporność na stres, większe plony

Kukurydza

W stadium 5 liści 2-3 l/ha Agri Kelp z 200 do 300 l wody - większa wydajność skrobi, więcej suchej masy, wyższa zawartość energetyczna

Burak cukrowy

W stadium 4-8 liści 2-3 l/ha Agri Kelp z 200 do 300 l wody - większa produkcja buraków, większa ilość pozyskiwanego cukru

Cebula

Od etapu 5 liści (około 1 tygodnia przed utworzeniem cebulki), 2 l/ha Agri Kelp z 200 do 300 l wody (w połączeniu z czynnikiem zwilżającym/środkiem adhezyjnym) - lepszy wzrost, bardziej vitalne uprawy, większe plony, dłuższy okres trwałości

Uprawy warzyw

W stadium 3-5 liści z 2 l/ha; powtórzyć po 14 dniach, jeżeli będzie to konieczne - bardziej vitalne uprawy, większe plony

Drzewa owocowe Przy przesadzaniu 1-2% roztwór Agri Kelp (około 1/2 l wody do nawadniania na drzewo) na początku kwitnienia 4 l/ha Agri Kelp z 1000 l wody (stężenie nie mniejsze niż 0,4%), po kwitnieniu 2 - 3 w stężeniu 0,4% w odstępie 2 tygodni

Truskawki Zanurzanie w 1-2% roztworze Agri Kelp, kilka aplikacji z 2-3 l/ha (w 400 l wody) w odstępach co 3-4 tygodnie do 60 dni przed końcem zbiorów - bardziej vitalne uprawy, poprawa wchłaniania składników odżywczych, lepsza trwałość i podatność transportowa, większa wydajność

Winogrona Na początku wegetacji, przy długości pędów 20-30 cm, 2-3 l/ha Agri Kelp z 400 l wody - lepsze wchłanianie składników odżywczych

Szkółki drzewne/rośliny ozdobne a) Młode rośliny: Zanurzanie lub polewanie tacek młodych roślin 1-3% roztworem Agri Kelp, 2-3 razy w odstępach 2-3 tygodni połączone z opryskiwaniem liści 0,5% roztworem b) Przed przesadzeniem: tuż przed przesadzeniem zanurzyć gołe korzenie lub tacki młodych roślin 1-3% roztworem Agri Kelp; alternatywnie polewać 1-3% roztworem Agri Kelp

Faza wzrostu: w ciągu pierwszych dwóch lat uprawy dodanie 300 ml/100 l wody (0,3%) w połączeniu z aplikacją dolistną poprawia wzrost, przyspiesza wzrost, zmniejsza straty związane z przesadzaniem, krótszy czas do osiągnięcia pożądanej wielkości rośliny

EuVoc Agri Kelp jest łatwo mieszalny z nawozami dolistnymi i środkami ochrony roślin i dlatego może być stosowany w połączeniu z nimi. Przed użyciem zaleca się wykonanie testu mieszalności. Nie używać razem ze skracaczami słomy (CCC) w rolnictwie. Zaleca się stosowanie środka zwilżającego/środka adhezyjnego, aby zapewnić dobre wchłanianie EuVoc Agri Kelp przez liść.

Nie wyrzucać pojemnika do środowiska



Producent:

GENETTI ECO S.R.L.S. - 01767/16

Via Goldegg 2, 39011 Lana | info@genettieco.com

5 KG

Skład: Naturalny brązowy ekstrakt z alg (*Ascophyllum nodosum*) ok. 20% suchej masy

Ascophyllum nodosum
(Workoliść członowaty) 30

Naturalny nawóz dolistny na bazie wyciągu z alg brunatnych. Nawóz zawiera substancje organiczne, które są delikatnie przetwarzane i ekstrahowane w celu zachowania substancji witalnych. W ten sposób uzyskuje się jednorodną zawiesinę, bardzo dobrze przyswajaną przez liść i system korzeniowy. Preparat w formie sproszkowanej nie posiada tych walorów. Algamin będący ekstraktem z alg brązowych (*Ascophyllum nodosum*), zawiera wiele naturalnych fitohormonów, takich jak: cytokiny, auksyny, gibereliny, betainy.

Zastosowanie i dawkowanie

Sposób działania

Algamin stymuluje rośliny w stadium zarodkowym i w stadium początkowego wzrostu, a tym samym stymuluje rozwój silnego systemu korzeniowego, jednocześnie wspierając wzrost komórek roślinnych, tworząc w ten sposób podstawę do bardzo dobrego wzrostu i plonów.

Uprawy owoców

150-200 ml/ha (3 l/ha) w fazach wstępnego kwitnienia i pełnego kwitnienia (wydajność owocowa) C, D, E 150-200 ml/ha (3 l/ha). Od momentu osiągnięcia wielkości orzecha

Winogrona do produkcji wina

200-250 ml/hl (4 l / ha) w fazach E, F

150-200 ml/ha (3 l/ha) w fazie H, przed kwitnieniem

150-200 ml/hl (3 l/ha) jako dodatek do każdej kuracji ochronnej

Uprawy specjalne

Kapusta, cebula na początku wegetacji i około 20 dni później 200-250 ml/hl (4 l/ha)

Nawóz dolistny najlepiej stosować, gdy rośliny znajdują się pod wpływem stresu lub są osłabione przez suszę, mróz, choroby lub szkodniki oraz pobudzać je do zdrowego wzrostu; wspiera on kwitnienie i wydajność upraw owocowych.

Nie wyrzucać pojemnika do środowiska

Dystrybutor:

GENETTI ECO S.R.L.S.01767/16

Via Goldegg 2, 39011 Lana | info@genettieco.com

5 KG

Eco Aminagron

Kategoria: Organiczny
hydrolizowany nawóz płynnego
azotu zwierzęcego.
Skład: 9% azotu (N) ogółem 9%
azotu (N) organiczny 9%
Węgiel (C) pochodzenia
organicznego 30%

Rozległe (kukurydza, ryż, zboża) 3-5 l/ha, 1-3 aplikacji

Uprawa oliwek 2 - 3 l/ha l/ha, 2-4 aplikacji

Od fazy poprzedzającej kwitnienie 10-15 l/ha w całym cyklu co 7-10 dni.

Uprawy owoców i winogron stołowych 2 - 3 l/ha, 6-7 aplikacji.

Od fazy poprzedzającej kwitnienie po wzrost owoców - 10-15 l/ha podczas całego
cyklu co 7-10 dni,

Winogrona 2-3 l/ha l/ha, 4-5 aplikacji.

Od fazy poprzedzającej kwitnienie 10-15 l/ha w całym cyklu co 7-10 dni.

Uprawy warzyw 2-5 l/ha przez cały cykl. 10-15 l/ha przez cały cykl.

Zawartość netto: Aminokwasy ogółem: 40% aminokwasów organicznych: 12% aminokwasów; alanina 2,8; histydyna 0,1; prolina 3,5; arginina 0,4; izoleucyna 0,4; seryna 0,1; kwas spartanowy 1,2; leucyna 0,8; treonina 0,1; kwas glutaminowy 2,6; lizyna 0,8; tyrozyna 0,5; glicyna 6,4; metionina 0,3; walina 0,7; hydroksylizyna 0,5; ornityna 1,2; hydroksyprolina 2,1; fenyloalanina 0,5;

Produkt zawiera również oligopeptydy i monosacharydy.

Środki ostrożności:

Mieszanina aminokwasów i peptydów o szybkim działaniu. Charakterystyka: Produkt zawiera podwyższoną zawartość azotu organicznego (w postaci aminokwasów i peptydów) szybko wchłanianego dolistnie, skutecznie pobudzającego proces wzrostu i zmniejszającego stres środowiskowy. Zalecenia: Nie używać w ekstremalnych warunkach klimatycznych w mieszaninie z siarką. W przypadku upraw wrażliwych nie należy używać więcej niż 300 ml/hl. Produkt nie jest kompatybilny z olejami mineralnymi i solami miedzi. Produkt należy używać wyłącznie do wskazanych zastosowań oraz zgodnie z instrukcjami podanymi na etykiecie. Używać tylko dla zastosowań wskazanych na etykiecie. Użytkownik produktu ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania produktu. Przestrzeganie wszystkich zastosowań i warunków wskazanych na etykiecie jest istotne dla zapewnienia dobrej skuteczności kuracji i zapobieżenia szkodom u roślin, ludzi i zwierząt. Aby uniknąć ryzyka dla ludzi i środowiska, postępuj zgodnie z informacjami umieszczonymi na etykiecie. Nie sprzedawać otwartego produktu. Pojemniki usuwać zgodnie z przepisami. Nie należy wyrzucać pustych pojemników do środowiska. Opakowania nie wolno ponownie wykorzystywać. Produkt nie jest palny. Przechowywanie: Wyrób przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Nie przechowywać w temperaturach poniżej 0°C lub powyżej 30°C. Produkt powinien być suchy i zabezpieczony.


Wyjaśnienia środków ostrożności CLP

Chronić przed dziećmi (P102). Po użyciu należy umyć dokładnie ręce. (P264) Podczas pracy nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu. P270 Nosić rękawice i odzież ochronną. Chronić oczy i twarz (P280). W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dokładnie ręce wodą i mydłem. (P302 + P352). W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe. Nadal płukać wodą. (P305 + P351 + P338).

Dodatkowe informacje:

Nie zanieczyszczać wody produktem ani pojemnikiem. Zwroty określające zagrożenia: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki (H412). **Ostrzeżenia:** Chronić przed dziećmi (P102) Przechowywać w zamkniętych pomieszczeniach. Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu (P270). Nie usuwać do środowiska naturalnego. Dodatkowe informacje: Nie zanieczyszczać wody produktem ani opakowaniem. Instrukcje dla lekarzy: W razie zatrucia wezwać lekarza pogotowia ratunkowego i podjąć pierwszą pomoc. Uwaga: Zadzwoń do najbliższego centrum ds. trucizn i zagrożeń.

Nie wyrzucać pojemnika do środowiska



Producent:

GENETTI ECO S.R.L.S. - 01767/16

Via Goldegg 2, 39011 Lana | info@genettieco.com

5 KG

Nawóz WE

Nawóz azotowy z siarką (S) o wysokiej zawartości siarki (53% SO₃, w tym 22% S).

Skład

Azot N 15% (200g/l)

Z czego:

- Amon rozpuszczalny w wodzie: 10%
- Mocznik: 5% rozpuszczalny w wodzie
- bezwodnik kwasu siarkowego (SO₃) 53%

Mieszalność

Produkt można mieszać z płynnymi i sproszkowanymi nawozami NPK, ale należy unikać tych o kwaśnym pH. Zaleca się, aby zawsze najpierw stosować małe ilości w celu sprawdzenia tolerancji. Używać wyłącznie w przypadku rzeczywistej potrzeby. Nie przekraczać zalecanej dawki. Produkt nie toleruje wahań temperatury; należy przechowywać w normalnych temperaturach.

Zalety i podstawowe funkcje:

Produkt przekształca i zachowuje pierwiastki oraz pierwiastki śladowe obecne w glebie w stanie zredukowanym, czyniąc je bardziej aktywnymi i dostępnymi dla roślin. Dzięki kwaśnemu odczynowi, przy wysokim pH siarka uwalnia obecne w glebie składniki odżywcze pochodzące z nierozpuszczalnych związków lub chemicznych wiązań, co przyczynia się do ponownej aktywacji zdolności wymiany kationów i zwiększa żyzność gleby. Częściowo zmniejsza użycie chelatów żelaza i manganu. Zmniejsza zasolenie gleby.

Zastosowanie i dawkowanie

Dla drzew uprawnych (jabłoni i gruszy) jako nawóz dolistny do użytku przed kwitnieniem, 3-5 l/ha; jeżeli chcesz wykorzystać nawóz podczas kwitnienia skontaktuj się z konsultantem.

Do fertygacji na początku wegetacji i wzrostu owoców, dawka 35-50 kg/ha. Do roślin warzywnych na etapie wzrostu do 15 cm.

Owoce pestkowe przed kwitnieniem 3-5 l/ha. Dla upraw przemysłowych, 3-5 l/ha. W przypadku wszystkich innych upraw, aby uniknąć ewentualnych szkód, nie należy przekraczać maksymalnej zalecanej dawki. W razie potrzeby skontaktować się z konsultantem.

Uwaga: Zawiera amon

H315 Działa drażniąco na skórę. H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P273 Unikać uwalniania do środowiska. P280 Stosować rękawice ochronne i odzież ochronną, w tym ochronę oczu. P305 +351 +338: W przypadku dostania się produktu do oczu należy ostrożnie płukać oczy wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337 +313: W przypadku utrzymania się działania drażniącego na oczy należy zasięgnąć porady lekarza. P302+352: W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem. P335-313: W przypadku podrażnienia skóry należy skonsultować się z lekarzem.



Nie wyrzucać pojemnika do środowiska

Producent:

GENETTI ECO S.R.L.S. - 01767/16

Via Goldegg2, 39011 Lana info@genettieco.com

10

Nawóz WE

Nawóz azotowy z siarką (S)

Skład:

Azot N 18% (180g w/w)

Z czego: rozpuszczalny w wodzie amon 18%
rozpuszczalny w wodzie bezwodnik kwasu
siarkowego (SO₃) 92%

Charakterystyka:

Wysoka zawartość siarki (92% SO₃, z czego 40% S).

Silne wiązanie azotu amonowego i siarki umożliwia niskie straty związane ze zmywaniem i ulatnianiem. Produkt ma silne działanie redukujące i zakwaszające i uwalniające siarkę w glebie.

Dawkowanie i zastosowanie: Dla drzew uprawnych (jabłoni i gruszy) jako nawóz dolistny do użytku przed kwitnieniem, 2-3 l/ha; jeżeli chcesz wykorzystać nawóz podczas kwitnienia skontaktuj się z konsultantem. Do fertygacji na początku wegetacji i wzrostu owoców, dawka 25-40 kg/ha. Uprawy warzyw w fazie do 15 cm. Owoce pestkowe przed kwitnieniem 2-3 kg/ha. Upraw przemysłowe, 2-3 kg/ha. W przypadku wszystkich innych upraw, aby uniknąć ewentualnych szkód, nie należy przekraczać maksymalnej zalecanej dawki. W razie potrzeby skontaktować się z konsultantem.

Mieszalność:

Produkt można mieszać z płynnymi i sproszkowanymi nawozami NPK, ale należy unikać tych o kwaśnym pH. Zaleca się, aby zawsze najpierw stosować małe ilości w celu sprawdzenia tolerancji. Używać wyłącznie w przypadku rzeczywistej potrzeby. Nie przekraczać zalecanej dawki. Produkt nie toleruje wahań temperatury; należy przechowywać w normalnych temperaturach.

Zalety i podstawowe funkcje:

Produkt przekształca i zachowuje pierwiastki oraz pierwiastki śladowe obecne w glebie w stanie zredukowanym, czyniąc je bardziej aktywnymi i dostępnymi dla roślin. Dzięki kwaśnemu odczynowi, przy wysokim pH siarka uwalnia obecne w glebie składniki odżywcze pochodzące z nierozpuszczalnych związków lub chemicznych wiązań, co przyczynia się do ponownej aktywacji zdolności wymiany kationów i zwiększa żyzność gleby. Częściowo zmniejsza użycie chelatów żelaza i manganu. Zmniejsza zasolenie gleby.

Uwaga: Zawiera amon

H315 Działa drażniąco na skórę. H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P273 Unikać uwalniania do środowiska. P280 Stosować rękawice ochronne i odzież ochronną, w tym ochronę oczu. P305 +351 +338: W przypadku dostania się produktu do oczu należy ostrożnie płukać oczy wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337 +313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy należy zasięgnąć porady lekarza. P302+352: W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem. P335-313: W przypadku podrażnienia skóry należy skonsultować się z lekarzem.



Nie wyrzucać pojemnika do środowiska

Eko botifrend

Rodzaj nawozu organicznego: Prosty, niezagęszczony nawóz roślinny z zawartością mikoryzy (*Glomus* spp.): 0,005% bakterii ryzosferowych (*Bacillus subtilis*, *B. licheniformis*, *B. amyloliquefaciens*, *B. megaterium*, *B. pumilus*, *B. simplex*): 1x10⁸ CFU/g.

Produkt nie zawiera organizmów modyfikowanych genetycznie ani organizmów patogennych (salmonelli, bakterii coli typu kałowego, tlenowych bakterii mezofilnych, jaj nicieni). Produkt jest stabilny w normalnej temperaturze i ciśnieniu. Przechowywać w temperaturze od 4° C do 35° C. W przypadku wycieknięcia płynu, usunąć przy użyciu trocin i/lub piasku.

DOPUSZCZONY DO STOSOWANIA W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

Surowce: Dozwolone bakterie określone w art. 3 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 889/2008, nawozy wykonane z nieimpregnowanego drewna, korzenie sorgo.

Wprowadzony do obrotu zgodnie z prawem włoskim, dekretem ustawodawczym 75/2010, załącznik 6; zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 764/2008.

UŻYWANE ILOŚCI

Produkt wpływa na metabolizm roślin. Aby uzyskać najlepsze wyniki, konieczne jest należyte stosowanie produktu. Produkt utrzymuje maksymalną skuteczność przez 5-7 dni.

WARZYWA, TRUSKAWKI W SZKLARNIACH

Nawożenie dolistne: 200-250 ml/hl (min. 2 l/ha), w razie potrzeby co 7/15 dni.

Nawożenie dokorzeniowe: 2,5 l/ha, podczas przesadzania (siania) i ponownie po 15 dniach używając 1,5 l/ha, w razie potrzeby stosować co 20 dni.

WARZYWA, TRUSKAWKI W UPRAWIE POŁOWEJ

Nawożenie dolistne: 250-300 ml/hl (min. 2,5 l/ha), w razie potrzeby co 7/15 dni.

Nawożenie dokorzeniowe: 2,5-3,0 l/ha, podczas przesadzania (siania) i ponownie po 15 dniach używając 1,5 l/ha, w razie potrzeby stosować co 20 dni.

UPRAWY OWOCÓW

Nawożenie dolistne: 250-300 ml/hl (min. 2,5 l/ha), w pełnym rozkwicie i w razie potrzeby przed zbiorem. Nawożenie dokorzeniowe: 1,5 l/ha, podczas przesadzania (kiełkowania) i ponownie po 30 dniach używając 1,5 l/ha.

WINO DO PRODUKCJI WINA, WINOGRONA STOŁOWE I CHMIEL

Nawożenie dolistne: 250-300 ml/hl (min. 2,5 l/ha) przed zamknięciem gron, w fazie dojrzewania i w przed zbiorami, w razie potrzeby.

UPRAWY KWIATOWE, ROŚLINY OZDOBNE

Nawożenie dolistne: 250-300 ml/hl (min. 2,5 l/ha), w razie potrzeby co 7/15 dni.

Nawożenie dokorzeniowe: 2,5-3,0 l/ha, podczas przesadzania (siania) i ponownie po 15 dniach używając 1,5 l/ha, w razie potrzeby stosować co 20 dni.

TRAWNIKI

250-300 ml/hl (min. 2,5 l) od połowy kwietnia co 15/30 dni w zależności od warunków środowiskowych i potrzeb trawnika.

Sposób użycia

Nawożenie dolistne: Równomiernie rozcieńczyć produkt w wodzie i rozpylić na roślinność. Ważne jest, aby równomiernie rozprowadzić roztwór w celu zapewnienia jednorodnej powłoki, a tym samym doskonałej funkcjonalności produktu. Podczas użytkowania zaleca się stosowanie systemów wysokociśnieniowych. Zakwasić roztwór do pH 6 najlepiej kwasami organicznymi (kwas cytrynowy, kwas octowy). Używać w najchłodniejszych porach dnia. Nie używać w wietrznych warunkach. Optymalna temperatura wynosi od 18°C do 28°C. Aplikować w porach dnia, które gwarantują najlepsze warunki (w przypadku wysokich temperatur w ciągu dnia, stosować wieczorem, a w przypadku bardzo niskich temperatur w nocy, aplikować rano). Zastosowanie dokorzeniowe: stosować na wilgotnym terenie, nie używać dużych ilości wody, aby uniknąć wymywania; wymieszać z nawozem bogatym w substancje organiczne (np. skrawki mięsa lub wywary gorzelniane 2-3 kg/ha).

KOMPATYBILNOŚĆ I INSTRUKCJE

Produkt można stosować samodzielnie. Produkt jest co do zasady kompatybilny z obornikiem, insektycydami, akarycydami, nematocydami i fungicydami z wyjątkiem produktów o wysokiej kwasowości (pH <3,0) lub zasadowości (pH > 8,5). Aby zagwarantować najwyższą skuteczność, zaleca się nie mieszać go z produktami zawierającymi miedź oraz stosować w odstępie co najmniej 48/72 godzin. Przed przystąpieniem do masowego stosowania każdorazowo zaleca się przeprowadzenie testów mieszanin na roślinach. Po użyciu zaleca się umycie sprzętu wodą i innymi odpowiednimi środkami czyszczącymi

w celu zapobieżenia polimeryzacji produktu. Może zatkać dysze. Producent i dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowe przechowywanie, przetwarzanie i użytkowanie produktu.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać opakowanie w suchym, chłodnym i wentylowanym miejscu; nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Przechowywać w temperaturze od 4°C do 35°C. Po częściowym zużyciu produktu należy szczelnie zamknąć opakowanie. Nie zamrażać. Nie należy premiksować ani przechowywać w formie rozcieńczonej. Nie sprzedawać luzem. Pojemnik nie może zostać ponownie użyty. Nie należy wyrzucać pustych pojemników do środowiska. Usunąć zgodnie z obowiązującymi normami.

SADZENIE: Warzywa: czosnek, szparagi, boćwina, buraki, brokuł, kapary, karczochy, ostrożeń, marchewka, kalafior, brukselka, kapusta, kapusta włoska, ciecierzycza, ogórek, botwinka, cebula, fasola, fasolka szparagowa, bób, koper włoski, sałaty (cykoria, cykoria puntarella, rzeżucha, sałata, zielona sałata awokado, endyvia, rukola, rozspunka jadalna, mniszek lekarski), soczewica, bakłażan, ziemniak, papryka, groch, pomidor, por, kalarepa, rzodkiewka, szalotka, skorzonera, seler, seler korzeniowy, szpinak, dynia, cukinia. Uprawy owocowe: actinidia, drzewo morelowe, czereśnia zimowa, cytrusy (drzewo pomarańczowe, cedr, gorzka pomarańcza, kumkwat, limonka, cytryna, mandarynka, klementynka, grejpfrut), drzewo nerkowca, ananas, orzeszki ziemne, kiwi, awokado, babaco, bananowiec, kaki, kasztanowiec, wiśnia, palma kokosowa, arbuz, palma daktylowa, feijoa, figa, opuncja, truskawka, kiwano, liczi, drzewo mango, drzewo migdałowe, mangostan, jabłko, granat, melon, miszpełnik, orzech laskowy, orzech, orzech brazylijski, papaja, passiflora, grusza, brzoskwinia i nektarynka, małe owoce (malina, jagoda, Rubus ulmifolius, czarna porzeczka), orzeszki piniowe, pistacje, śliwka. Winogrona stołowe i do produkcji wina. Zioła: laur, koper, bazylija, kolendra, estragon, hyzop lekarski, majeranek, mięta, mirt, oregano, pietruszka, rozmaryn, szałwia, szafran. Rośliny przemysłowe: owies, orkisz, pszenica, gryka, kamut, kukurydza, jęczmień, żyto, soja, groszek, tytoń, słonecznik. Uprawy kwiatowe, rośliny ozdobne, trawniki.

OBCHODZIĆ SIĘ OSTROŻNIE

EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P102 - Chronić przed dziećmi. P270 - Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. WSTRZĄSNAĆ PRZED UŻYCIEM



Nie wyrzucać pojemnika do środowiska

Producent:

GENETTI ECO S.R.L.S. - 01767/16

Via Goldegg 2, 39011 Lana | info@genettieco.com

5 KG

Dla wszystkich upraw z niedoborem miedzi. Stosuje się go w kuracjach dolistnych przy pierwszym wystąpieniu niedoboru miedzi (unikać aplikacji podczas kwitnienia), 2-3 razy w dawce 200-250 g/hl, z przerwą 7-10 dni między aplikacjami. Stosować do momentu, aż roślina wróci do zdrowia. Można go również stosować prewencyjnie, 1-2 razy w dawce 100-150 g/hl.	WŁAŚCIOWŚCI MIEDŹ (CU), ROZPUSZCZALNA W WODZIE:15% CAŁKOWITA WSKAŹNIK SCHELATOWANIA:100%, W TYM MIEDŹ (CU), CHELATOWANA Z EDTA:15%
--	--

Jabłka, gruszkowi i owoce pestkowe:Wsparcie wypadania liści i przyspieszenie gojenia łodyg opadłych liści, po zbiorach należy dolistnie zaaplikować dawkę 200-300 g/hl, jesienią w szkółkach w dawce 300-600 g/hl rozpuszczonej w co najmniej 1000-1500 litrach wody na hektar.Dawka zmienia się w zależności od odmiany i warunków sezonowych, które wpływają i opóźniają naturalne opadanie liści.Jeżeli to konieczne powtórzyć aplikację po 10-15 dniach.

Nie wyrzucać pojemnika do środowiska



Dystrybutor:
 GENETTI ECO S.R.L.S.- 01767/16
 Via Goldegg 2, 39011 Lana | info@genettieco.com

5 KG

GENETTI ECO S.R.L.S.- 01767/16
 Via Goldegg2, 39011 Lana | info@genettieco.com

CHELAT ŻELAZA eddha

Żelazo (Fe) rozpuszczalne w wodzie 6% chelat żelaza (Fe) z EDDHA 6% czynnik chelatujący: EDDHA

Przedział pH zapewniający dobrą stabilność frakcji schelatowanej: 4 – 9
Produkt zatwierdzony do stosowania w rolnictwie ekologicznym: Chelat żelaza EDDHA

Uprawy warzyw 5-10 kg/ha

Uprawy owoców 10-15 kg/ha

Stosować w sposób miejscowy lub przy użyciu odpowiedniego sprzętu do aplikacji w grunt (szpadel lub piki), rozprowadzając na każdą roślinę z objawami chlorozy. Dla młodych roślin 40-50 g/roślinę (uprawa winorośli 40-60 g/roślinę); dla dojrzałych roślin 60-100 g/roślinę (uprawa winorośli 100-150 g/roślinę); w przypadku kwiatów, 1-1,5 kg/1000 m²
Dla upraw przemysłowych, 2-3 kg/ha

Mieszalność

Produkt jest mieszalny z innymi preparatami, ale zawsze zaleca się przeprowadzenie wcześniejszych małych testów w celu sprawdzenia kompatybilności.

Charakterystyka: Preparat na bazie chelatu żelaza EDDHA z wysokim procentem żelaza orto-orto (80%), ze stabilnym wiązaniem, które w związku z tym trudno się utlenienia. Najlepszy środek chelatujący do dokorzeniowego wprowadzenia żelaza. Zapobiega i zmniejsza zmianom spowodowanym niedoborem żelaza. Pobudza roślinę do wytwarzania większej ilości chlorofilu, aby osiągnąć wyższy poziom wydajniejszej fotosyntezy. Zwiększa tworzenie się suchej masy i węglowodanów w roślinie podczas syntezy cukrów i białek. Zwiększa produktywność i poprawia cechy jakościowe (kolor, smak itp.). Nie pozostawia pozostałości w roztworze. CHEL-Ferr 6 jest wchłaniany przez roślinę głównie w pierwszej fazie rozwoju. Aplikacja odbywa się bezpośrednio do gleby lub podczas fertygacji. Stosowany profilaktycznie na początku wegetacji drzew, a dla upraw warzyw oraz

kwiatów, po przesadzeniu. W przypadku upraw drzewnych skuteczne są również zabiegi po zbiorze lub pod koniec cyklu wzrostu (kiwi). W tym przypadku zapas żelazo osadza się w tkance roślinnej przed hibernacją.

Nie wyrzucać pojemnika do środowiska



Producent:

GENETTI ECO S.R.L.S. - 01767/16

Via Goldegg 2, 39011 Lana | info@genettieco.com

5 KG

NAWÓZ WE Z CHELATEM ŻELAZA (EDTA) ŻELAZO ROZPUSZCZALNE W WODZIE 13% ŻELAZO (FE) SCHELATOWANE EDTA 13% Czynnik chelatujący: EDTA. Przedział pH gwarantujący dobrą stabilność mieści się pomiędzy:4-6 Używać wyłącznie w przypadku rzeczywistej potrzeby. Nie należy przekraczać wskazanych dawek. Zatwierdzony dla rolnictwa organicznego. Surowiec: Chelat żelaza (EDTA)	Dawkowanie i zastosowanie: Nawożenie dolistne Uprawy warzyw: 80-120 g/hl Uprawy owoców: 100-120 g/hl Uprawy kwiatów: 80-100 g/hl Uprawy przemysłowe: 100-150 g/hl Kiwi: 80-100 g/hl Cytrusy: 100-120 g/hl
--	--

Charakterystyka: Chel Ferr 13 EDTA to przydatna formuła do zwalczania wszelkich niedoborów żelaza. To zjawisko występuje najczęściej w glebach alkalicznych, z niedoborami substancji organicznej. Żelazo w roślinie stymuluje proces tworzenia chlorofilu i rozwój chloroplastów, a także jest ważne dla metabolizmu białka oraz oddychania. Żelazo nie może zostać wchłonięte przez rośliny z różnych powodów: wyjątkowo duże pokłady wapna, wysokie pH w glebie, duże ilości fosforu lub manganu w glebie, ściśnięta gleba, stres wegetatywny lub wodny. Objawy niedoboru żelaza są widoczne na kolorowych liściach, które wyglądają jak młode liście. Następnie okazuje się, że większość części staje się praktycznie martwa. W niektórych przypadkach liście mogą całkowicie stracić kolor. Po zastosowaniu Chel-Ferr 13 liście powracają do normalnego koloru, a rośliny są w stanie zacząć się rozwijać w ciągu 10-15 dni od użycia.



Nie wyrzucać pojemnika do środowiska

Dystrybutor:
GENETTI ECO S.R.L.S.- 01767/16
Via Goldegg 2, 39011 Lana | info@genettieco.com

5 KG

GENETTI ECO S.R.L.S.- 01767/16
Via Goldegg2, 39011 Lana | info@genettieco.com

CHEL-MAN 13% MN EDTA

NAWÓZ WE · CHELAT MANGANU (EDTA)

SKŁAD

MANGAN (MN) ROZPUSZCZALNY W
WODZIE 13% MANGAN (MN) W POSTACI
CHELATU EDTA 13% CZYNNIK
CHELATUJĄCY: EDTA.

Przedział pH zapewniający dobrą stabilność
frakcji chelatowej: 3-8

ZATWIERDZONY DLA ROLNICTWA
ORGANICZNEGO ZGODNIE Z
ROZPORZĄDZENIEM (WE) Nr 889/2008

Mieszalność

Produkt jest mieszalny z innymi preparatami, ale zaleca się zawsze
przeprowadzać małe testy w celu sprawdzenia kompatybilności.

Sposób użycia:

Stosować podczas fertygacji,
mieszając z innymi substancjami
odżywczymi lub
w przypadku samego niedoboru
manganu w dawce 2-3 kg/ha. Produkt
może być również aplikowany we
wszystkich uprawach dolistnie w
dawce 0,5-1,0
kg/ha.

Nie wyrzucać pojemnika do środowiska



Dystrybutor:

GENETTI ECO S.R.L.S. - 01767/16

Via Goldegg 2, 39011 Lana | info@genettieco.com

5 KG

NAWÓZ WE z

CHELATEM CYNKU

(EDTA)

SKŁAD:

CYNK (ZN) ROZPUSZCZALNY W WODZIE
15%

CYNK (ZN) JAKO CHELAT EDTA 15%
CZYNNIK CHELATUJĄCY: EDTA.

Przedział pH zapewniający dobrą stabilność
frakcji chelatowej: 3-8

ZATWIERDZONY DLA ROLNICTWA
ORGANICZNEGO ZGODNIE Z
ROZPORZĄDZENIEM (WE) Nr 889/2008

Stosować Zinco-Chel 15% Zn EDTA podczas fertygacji, mieszając z innymi substancjami odżywczymi, aby uzyskać zbilansowany roztwór lub uzupełniając sam niedobór cynku, w dawce 2-3 kg/ha. Produkt może być również aplikowany we wszystkich uprawach dolistnie w dawce 0,5-1,0 kg/ha. Idealny dla upraw hydroponicznych.

Charakterystyka i zalety

Krystaliczny preparat w proszku na bazie cynku w formie chelatu EDTA.

Leczy i zapobiega chorobom wywołanym niedoborem cynku.

Wzmaga rozwój roślin, ponieważ cynk jest katalizatorem syntezy tryptofanu, ważnego prekursora aminokwasu kwasu indolo-3-octowego, który jest auksyną, naturalną substancją regulującą wzrost.

Nie wyrzucać pojemnika do środowiska

Dystrybutor (dystrybutor)

GENETTI ECO S.R.L.S. - 01767/16
Via Goldegg 2, 39011 Lana | info@genettieco.com

Eco enka-phos

NAWÓZ WE

3-18 Nawóz WE
3% azotu N (całkowita zawartość)
18% K₂P potas, rozpuszczalny w wodzie
Produkt zawiera 27% P₂O₅ w postaci
kwasu fosforowego

Mieszalność: EnKa Phos jest mieszalny ze zwykłymi środkami ochrony roślin. Jednakże, w związku z faktem, że nie jest możliwe przewidzenie wszystkich nieprzewidzianych okoliczności zaleca się przeprowadzenie testu mieszania z małymi ilościami produktów przeznaczonych do opryskiwania. W przypadku mieszanin z nawozami dolistnymi lub środkami ochrony roślin należy napęścić strzykawkę do 2/3 wodą i osobno dodać produkty.

Zalecenia dotyczące stosowania (pierwszeństwo mają zalecenia otrzymane podczas oficjalnej konsultacji) **Winogrona do produkcji wina:** 2-3 l/ha na 1000 do 2000 l wody/ha (min. 0,2%): około 2-3 zastosowania

Chmiel: 2-3 l/ha na 1000 do 2000 l wody/ha (min. 0,2%): około 2-3 zastosowania

Uprawy owoców: 2-3 l/ha w 400 do 1000 l wody/ha

Truskawki: Zanurzenie :Korzenie i serca liści 0,3% przez ok. 20 minut. **Zabieg jesienny:** Koniec września - połowa października. 10 l w 1000 l wody/ha. Ziemiaki, korniszony, kapusta 3 l/ha, w razie potrzeby 400 do 1000 l wody/ha

Nasiona rzepaku: 2 l/ha w pierwsza aplikacja wiosenna i 2 l/ha w kuracji jesiennej.

Pietruszka: 3l/ha tygodniowo, 2-3 aplikacje na jedno cięcie.

Pod szkłem: podlewanie: 2 l/ha z 0,2 - 0,25% roztworem pożywki/m².

Salata: Przed sadzeniem: Podlać 0,2% pożywką.

14 dni po posadzeniu: 2 razy 2 l/ha w 400 do 600 l wody/ha co 8-10 dni.

Szparagi: Sadzonki: Przed sadzeniem zanurz korzenie w 0,3-0,5% roztworze pożywki na 15 minut.

Cebule: 2,5 l/ha 3-5 razy w odstępach 8-10 dni.

Wskazówki dotyczące zagrożeń: H315 Działa drażniąco na skórę H319 Działa drażniąco na oczy

Wskazówki bezpieczeństwa: P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305-P351-P338 W przypadku dostania się do oczu: Dokładnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe. Nadal płukać. P332 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Nie wyrzucać pojemnika do środowiska

Producent:

GENETTI ECO S.R.L.S. - 01767/16
Via Goldegg2, 39011 Lana |
info@genettieco.com

10L/12,5 KG

Fertigold 19-19-19 + Micro.

Nawóz WE

Nawóz NPK 19-19-19 z borem, miedzią, żelazem, manganem, molibdenem i cynkiem o niskiej zawartości chloru.

Skład mieszaniny

Azot (N) ogółem 19% azot (N) azotan 10,5% azot (amon) 8,5% fosfor (P₂O₅) rozpuszczalny w obojętnym

cytrynianie amonu i w wodzie. 19%

potas (K₂O) rozpuszczalny 19%

bor (B) rozpuszczalny 0,01% chelat miedzi (Cu) EDTA 0,005% miedź (Cu)

rozpuszczalna 0,005% chelat żelaza (Fe) EDTA 0,003%

żelazo (Fe) rozpuszczalne 0,003%

chelate manganu (Mn) EDTA 0,01%

manganu (Mn) rozpuszczalny 0,01%

molibden (Mo) rozpuszczalny 0,007%

chelate cynku (Zn) EDTA 0,01%

cynk (Zn) rozpuszczalny 0,01%

Dawka i zastosowanie:

Podczas fertygacji:

Polowe uprawy owocowe, uprawy przemysłowe i warzywne

50-150 kg/ha na kurację.

Dawki i liczba aplikacji

należy stosować dostosowując do wymogów upraw, faz fenologicznych

i właściwości gleby.

Mieszalność:

Produkt nie wykazuje żadnych niepożądanych działań w mieszaninie

z innymi preparatami; jednakże zawsze zaleca się

przeprowadzenie wcześniejszych małych testów w celu sprawdzenia kompatybilności.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt. Unikać kontaktu z oczami i skórą.

Nie usuwać do środowiska naturalnego. Nie sprzedawać luzem.

Czynnik chelatujący dla Cu, Fe, Mn, Zn:

Przedział pH EDTA gwarantujący

STABILNOŚĆ frakcji chelatowej: 3-8.

Nie wyrzucać pojemnika do środowiska

Producent:

GENETTI ECO S.R.L.S. - 01767/16

Via Goldegg 2, 39011 Lana | info@genettieco.com

25 KG

Producent:

GENETTI ECO S.R.L.S. - 01767/16

Via Goldegg 2, 39011 Lana | info@genettieco.com

Skład substancji

organicznej:16,5%

Proporcja humusowej substancji

organicznej w stosunku do % substancji

organicznej: 89%

Substancja organiczna:96%

Azot organiczny:1%

stosunek C/N:44,5%

Parametr: pH 11 + - 0,5

Ciężar właściwy (przy 20% C) 1,11 kg/l

Skład

5 litrów = 5 kg (gęstość:1 kg/l)

Humiplus 16 to naturalny koncentrat o wysokiej zawartości czystych kwasów

humusowych pozyskiwanych z amerykańskiego leonardytu. Stosowany

osobno lub w połączeniu z innymi nawozami NPK

i pierwiastkami śladowymi.+ wzmacnia koloidalną

aktywność gleby, przywraca strukturę fizyczno-

chemiczną i wymianę kationów. Pozwala na

lepsze wchłanianie składników odżywczych.+

przenosi substancje organiczne do gleby, a

pożyteczna mikroflora stanowi idealne podłoże

do wzrostu. Regeneruje aktywność

mikrobiologiczną, odżywia i stymuluje

mikroorganizmy występujące w glebie.

NAWÓZ WE

Zastosowanie i dawkowanie

Winogrona stołowe i winogrona do produkcji wina

Początek wzrostu wegetatywnego do początku wzrostu całego cyklu.

2-4 aplikacje: Dolistnie 1-2 kg/ha. Przy fertygacji 15-25 kg/ha.

Uprawy warzywne i przemysłowe

Kilka zastosowań od rozpoczęcia przesadzania do fazy początkowego wzrostu lub przez cały cykl. Wielokrotnie: Dolistnie 1-2 kg/ha, fertygacja:10-20 kg/ha.

Uprawy szklarniowe: Po zasadzeniu do początkowego wzrostu lub przez cały cykl. Wielokrotne zastosowanie dolistne 100-200 g/hl. Podczas fertygacji:1-2 kg/1000 m².

Mieszalność

Produkt jest mieszalny z prawie wszystkimi dostępnymi w handlu produktami, z wyjątkiem miedzi, siarki i olejów mineralnych. Aby nie zniszczyć substancji humusowej należy unikać mieszania z substancjami bardzo kwaśnymi. Zaleca się wcześniejsze sprawdzenie w celu potwierdzenia pełnej kompatybilności.

Nie wyrzucać pojemnika do środowiska

Producent:

GENETTI ECO S.R.L.S.- 01767/16

Via Goldegg 2, 39011 Lana | info@genettieco.com

5 KG

Kwasy humusowe z chelatowanymi pierwiastkami śladowymi Fe 4%, Zn 2,5%, Mn 1,5%

Do nawożenia dolistnego oraz nawożenia gleby. Pierwiastki śladowe odgrywają ważną rolę w elementach struktury liści, takich jak chlorofil i enzymy kluczowe dla zdrowia roślin. Niedobór pierwiastków śladowych, cynku, manganu i żelaza powoduje przebarwienie liści na kolor żółty oraz hamuje wzrost rośliny. W Humiplus Micro pierwiastki śladowe są naturalnie chelatowane przez kwasy humusowe i są bardzo szybko dostępne dla rośliny. W przypadku niedoboru nawóz ten może bardzo szybko zareagować i przywrócić roślinie równowagę. Roślina zwiększa dostępność nawozów poprzez kwasy humusowe i poprawia jakość gleby. Produkt Humiplus Micro wzmacnia strukturę komórek i ze względu na kwasy humusowe lepiej działa na rośliny w glebach zasadowych. Rośliny będące pod wpływem stresu ze względu na przesuszenie lub zabiegi ochrony roślin szybciej się regenerują. Kwasy humusowe są organiczne i, w przeciwieństwie do syntetycznych chelatów, nie zawierają soli takich jak EDDHA. Pozostałości herbicydów i

trucizn w glebie są niższe.

Ekonomiczny i ekologiczny dostawca pierwiastków śladowych, których większość - Zn, Mn, Fe jest bezpośrednio pobierana bez konieczności ich konwersji za pomocą chelatów syntetycznych.

Ze względu na ilość kwasów humusowych i fulwowych bardzo skuteczny w glebach alkalicznych o mniejszej zmywalności, z lepszym bilansem wodnym.

Skład

kwasy humusowe: 40%
żelazo chelatowane: 4%
cynk chelatowany: 2,5%
chelатовany mangan: 1,5%
rozpuszczalność w
wodzie: 100%
nasycony roztwór: ~ 100 g/l

Stabilny zakres pH: 6

Zastosowanie i dawkowanie

Dla wszystkich roślin uprawnych

Cel: Eliminacja niedoboru Fe/Zn/ Mn, poprawa stanu gleby, wzrost żyzności gleby i wykorzystania nawozów

Zalecana dawka: 4-6 kg/ha podzielona na kilka dawek (1 kg/ha) lub przy niedoborze Fe/Zn/Mn

Warzywa w uprawie szklarniowej (pomidory, papryka, bakłażan, ogórki, cukinie)

Cel: Eliminacja niedoboru Fe/Zn/ Mn, poprawa stanu gleby, wzrost żyzności gleby i wykorzystania nawozów

Zalecana dawka: 6-8 kg/ha podzielony na kilka dawek (1 kg/ha) w sezonie lub przy niedoborze Fe/Zn/Mn

Uprawy owoców (kiwi, owoce cytrusowe, winogrona, owoce pestkowe)

Cel: Eliminacja niedoboru Fe/Zn/ Mn, poprawa stanu gleby, wzrost żyzności gleby i wykorzystania nawozów

Zalecana dawka: 6-8 kg/ha podzielone na kilka dawek (1 kg/ha) lub 100-150 g/drzewo w sezonie lub przy niedoborze Fe/Zn/Mn

Warzywa w uprawie polowej

Cel: Eliminacja niedoboru Fe/Zn/ Mn, poprawa stanu gleby, wzrost żyzności gleby i wykorzystania nawozów

Zalecana dawka: 4-6 kg/ha podzielona na kilka dawek (1 kg/ha) lub przy niedoborze Fe/Zn/Mn

Zboża (pszenica, żyto, jęczmień, owies, kukurydza, ryż itp.), ziemniaki, fasola, orzeszki ziemne

Cel: Eliminacja niedoboru Fe/Zn/ Mn, poprawa stanu gleby, wzrost żyzności gleby i wykorzystania nawozów

Zalecana dawka: 4-6 kg/ha podzielona na kilka dawek (1 kg/ha) lub przy niedoborze Fe/Zn/Mn

Rośliny ozdobne, szkółki, ogrodnictwo krajobrazowe, trawniki (ogólnie)

Cel: Eliminacja niedoboru Fe/Zn/ Mn, poprawa stanu gleby, wzrost żyzności gleby i wykorzystania nawozów

Zalecana dawka: 6-8 kg/ha podzielona na kilka dawek (1 kg/ha) lub przy niedoborze Fe/Zn/Mn

Nawożenie dolistne

Cel: Eliminacja niedoboru Fe/Zn/Mn, zwiększenie wykorzystania nawozów

Zalecana dawka: 300 g/1000 l wody co 2-3 tygodnie w sezonie lub w przypadku niedoboru Fe/Zn/Mn

Nie wyrzucać pojemnika do środowiska

Producent:

GENETTI ECO S.R.L.S. - 01767/16

Via Goldegg 2, 39011 Lana | info@genettieco.com

5KG

Ecoup hydro 46

Składnik: 46% miedzi (460 g/g). Chronić przed mrozem.

Zalecenia dotyczące stosowania (pierwszeństwo mają zalecenia otrzymane podczas oficjalnej konsultacji): Nie wolno przekraczać 3 kg czystej miedzi na hektar rocznie (w uprawach chmielu 4 kg).

Uwagi ogólne: Zaopatrzenie w składniki odżywcze z miedzią, przy niskim poziomie niedoboru miedzi 0,15 kg/ha, przy średnim niedoborze 0,3 kg/ha, przy dużym niedoborze 0,5 kg/ha rozpuszczone e 200-400 l wody/ha.

Winogrona do produkcji wina: 0,15 kg/ha - 0,50 kg/ha kilka razy od fazy 3 liści do zamknięcia gron. Chmiel: 0,75 kg/ha - 1,25 kg/ha kilka razy do 7 dni przed zbiorem (sam lub w mieszance zbiornikowej) w celu zapewnienia wydajności.

Zboża: 0,25 kg/ha - 0,50 kg/ha do fazy 32 (osobno lub w mieszance zbiornikowej) dla zapewnienia odporności, stabilności, wydajności, jakości ziaren.

Rzepak ozimy: 0,25 kg/ha - 0,50 kg/ha raz od fazy 2 liści do stadium pąka w celu zabezpieczenia wydajności.

Kukurydza, rośliny okopowe, rośliny strączkowe: 0,25 kg/ha - 0,50 kg/ha do momentu zamknięcia uprawy w celu zapewnienia jej wydajności.

Ziemniaki: 0,25 kg/ha - 0,50 kg/ha aż do ostatniego oprysku przeciwko zarazie w celu zapewnienia wydajności.

Owoce ziarnkowe i pestkowe: 0,20 kg/ha - 0,50 kg/ha w celu zapewnienia

wydajności. **Uprawy warzyw (szparagi, ogórki, marchew, cebula):** 0,25 kg/ha - 0,50 kg/ha w celu zapewnienia wydajności.

Użytki zielone: 1 kg/ha - 1,50 kg/ha w celu zapewnienia odporności i stabilności.

Mieszalność: Eco Hydrocup 460 P jest mieszalny ze zwykłymi środkami ochrony roślin. W związku z faktem, że nie jest możliwe przewidzenie wszystkich nieprzewidzianych okoliczności zaleca się przeprowadzenie testu mieszania z małymi ilościami produktów przeznaczonych do natryskiwania.

Utylizacja: Opakowanie, po jego całkowitym opróżnieniu należy zanieść do punktu recyklingu. Nie wykorzystywać ponownie opakowań do jakichkolwiek innych celów. Odnieść opakowania zawierające jakiegokolwiek pozostałości produktu do punktu zbiórki odpadów problematycznych.

Producent:
GENETTI ECO S.R.L.S. - 01767/16
ViaGoldeggi2, 39011 Lana | info@genettieco.com

UWAGA
Zawiera wodorotlenek miedzi (Indeks nr
029-02-00-3)

10

KG

PRODUKT PODLEGA UTRACIE MASY

Nie wyrzucać
pojemnika do
środowiska



Wdychanie grozi śmiercią. Działa szkodliwie po połknięciu. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, długotrwałe skutki. Unikać wdychania proszku. Nie wyrzucać pojemnika do środowiska. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z

lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:

Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić

mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ

DO OCZU: Dokładnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki

kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Produkt/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami krajowymi.

zmniejsza uszkodzenia spowodowane przez promieniowanie słoneczne,
zmniejsza zapotrzebowanie rośliny na wodę
zapobiega szkodliwym działaniom owadów, grzybów i pleśni.

**PRODUKT PRZEZNACZONY DO WOLNEJ
SPRZEDAŻY**

BIO

**REWITALIZUJE I WZMACNIA NATURALNE
MECHANIZMY OBRONNE ROŚLIN**

Kaolin jest produktem odwadniającym, pokrywającym warzywo patyną, która przeciwdziała efektowi cieplnemu, znacznie redukując okres zwilżania powierzchni roślin. Produkt ma również pośredni wpływ na rozwój fitofagicznych owadów i chorób grzybowych.

SKŁAD:

100% mączki skalnej.
Produkt uzyskiwany z mechanicznego frezowania kaolinu, bez zanieczyszczeń

DAWKOWANIE I SPOSÓB STOSOWANIA

Równomierny oprysk roślinności za pomocą wodnej zawiesiny o stężeniu 2,5-4 kg/hl



Środki ostrożności:

Kaolin Plus jest produktem naturalnym, nieszkodliwym dla ludzi, zwierząt i pożytecznych owadów. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w suchym, chłodnym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Przechowywać z dala od światła i w temperaturze od 5°C do 40°C. Przechowywać z dala od źródeł ciepła. W związku z faktem, że produkt składa się z mączki skalnej dodanej do wody, może być on stosowany w rolnictwie ekologicznym, zgodnie z rozporządzeniami WE 834/2007 i 889/2008

Nie wyrzucać pojemnika do środowiska

Dystrybutor:
GENETTI ECO S.R.L.S.- 01767/16
Via Goldegg 2, 39011 Lana | info@genettieco.com

5 KG

Produkt zapobiega tworzeniu się piany

Charakterystyka:

Jest to produkt oparty na oleju silikonowym stosowanym do usuwania piany powstałej podczas przygotowywania roztworów wodnych. Silikony zawarte we Flippy są w stanie skutecznie współpracować z cząsteczkami wody, zmieniając na poziomie chemicznym związki powodujące tworzenie się piany, dzięki czemu zjawisko to jest zwalczane, a piana jest szybko usuwana.

Ważne wskazówki:

Wstrząsnąć produktem przed użyciem. Unikać wystawiania produktu na działanie temperatur poniżej 0 ° C.

Kompatybilność:

Produkt jest kompatybilny z roztworami wodnymi. Nie wyrzucać pustych opakowań do środowiska.

Dawkowanie i instrukcja użycia: Dodaj odpowiednią ilość do roztworu wodnego. Zaleca się dodanie 15 ml do 1000 l wody. Dzięki specjalnemu dozownikowi można powoli dodawać produkt, aż do całkowitego rozpuszczenia piany, jednocześnie sprawdzając czy piana została usunięta.

Nie wyrzucać pojemnika do środowiska

Producent

GENETTI ECO S.R.L.S. - 01767/16

Via Goldegg 2, 39011 Lana | info@genettieco.com

250 ml



NAWÓZ WE

Mieszanina mikroelementów boru (B) (sodu) i (siarczanu) miedzi (Cu)

Rozpuszczalny w wodzie bor (B).....0,2%

Rozpuszczalna w wodzie miedź (Cu).....20%

Do używania wyłącznie w przypadku uzasadnionej potrzeby. Nie należy przekraczać odpowiednich dawek

DOZWOLONY W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

Surowiec: **boran sodu, sól miedzi (siarczan)**

PRODUKT PRZEZNACZONY DO WOLNEJ SPRZEDAŻY

Produkt powinien być stosowany do nawożenia dolistnego. **UPRAWY OWOCOWE (JABŁKO, GRUSZKA, BRZOSKWINIA, CZEREŚNIA, MORELA, ŚLIWKA)**

I WINOGRONA: użyć 2,8 - 3,3 kg/ha rozpuszczone w 500-700 litrach wody.

Oliwki: stosować 3,5 - 4,0 kg/ha rozpuszczone w 500-700 litrach wody.

TRUSKAWKA I UPRAWY WARZYW, W TYM KOPER WŁOSKI: użyć 2,5 - 3,5 kg/ha rozpuszczone w 500-700 litrach wody. **UPRAWY POŁOWE (BURAKI, ZBOŻA, RYŻ, TYTOŃ):**

użyć 2,0 - 4,0 kg/ha rozpuszczone w 400-600 litrach wody **NIE STOSOWAĆ PODCZAS KWITNIENIA**

Nie mieszać z produktami o odczynie zasadowym. Przed zmieszaniem ze środkami ochrony roślin lub nawozami należy przeprowadzić test kompatybilności.

Bor i miedź są pierwiastkami niezbędnymi do życia wszystkich roślin i często brakuje ich we włoskich glebach. Bor jest niezbędny do kiełkowania pyłków, do tworzenia kwiatów, owoców i korzeni, do transportu węglowodanów w roślinach i do wchłaniania kationów, zwłaszcza wapnia. Niedobory są częste, przede wszystkim w glebach alkalicznych i/lub pozbawionych materii organicznej. Miedź ma głównie funkcje katalityczne i bierze aktywny udział w procesach redoks, a także jest składnikiem ważnych enzymów. Rośliny z niedoborem boru i/lub miedzi są bardziej wrażliwe na ataki pasożytów.

UWAGA

Zawiera pięciowodny siarczan miedzi (numer indeksu 029-023-00-4)

Działa szkodliwie po połknięciu. Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W

PRZYPADKU KONTAKTU Z OCZAMI:

płukać dokładnie przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Nie usuwać do środowiska naturalnego.

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIECIA, któremu towarzyszy złe samopoczucie: skontaktować się z OŚRODKIEM KONTROLI ZATRUCI lub lekarzem



Producent:

GENETTI ECO S.R.L.S. - 01767/16

Via Goldegg 2, 39011 Lana | info@genettieco.com

10 KG

Nawóz WE

Hydrolizowany siarczan miedzi

Używać wyłącznie w przypadku rzeczywistej potrzeby

Nie należy przekraczać wskazanej dawki

Składnik aktywny zatwierdzony do użytku w rolnictwie ekologicznym: Siarczan miedzi

Mieszalność:

Nie mieszać z produktami o odczynie zasadowym.

Przed zmieszaniem ze środkami ochrony roślin lub nawozami należy przeprowadzić test kompatybilności.

Dawkowanie i zastosowanie:

Produkt stosowany do nawożenia dolistnego upraw drzew owocowych (jabłko, gruszka, brzoskwinia, wiśnia, morela, winogrona stołowe, migdały i winogrona do produkcji wina): użyć 1 - 1,4 kg/ha rozpuszczone w 500-700 litrach wody.

Oliwki: użyć 1,2 - 1,8 kg/ha rozpuszczone w 500-700 litrach wody.

Truskawki i uprawy warzywne, w tym koper włoski: użyć 1,3-1,9 kg/ha

rozpuszczone w 500-700 litrach wody.

Uprawy polowe (buraki, zboża, ryż, tytoń): użyć 0,7 - 1,2 kg/ha rozpuszczone w 400-600 litrach wody. Nie stosować podczas kwitnienia.

NIE STOSOWAĆ PODCZAS KWITNIENIA.

Miedź jest ważna dla życia roślin, głównie ze względu na funkcje katalityczne, a jej rola w metabolizmie roślin jest często komplementarna do żelaza. Jest to pierwiastek, który aktywnie uczestniczy w zjawisku oksydukcji, a także w tworzeniu ważnych enzymów, takich jak fenolaza (oksydaza mono- i polifenolowa), laktaza i oksydaza kwasu askorbinowego. Pełni również ważną rolę w syntezie chlorofilu i bierze udział w stymulowaniu naturalnej obrony roślin przed pasożytami. Niedobór miedzi jest zauważalny dzięki rozjaśnieniu i powstawaniu plam na liściach.

Uwaga

Zawiera: Pentahydrat siarczanu miedzi (nr indeksu 029-023-00-4)

Działa toksycznie po połknięciu. Powoduje uszkodzenie oczu.

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Chronić przed dziećmi. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą

przez kilka minut. W razie potrzeby zdjąć soczewki kontaktowe i nadal płukać. Nie usuwać do środowiska naturalnego. Odzież ochronna

Rękawice chroniące oczy i twarz. W przypadku połknięcia, któremu towarzyszy złe samopoczucie: skontaktować się z ośrodkiem kontroli zatruc lub lekarzem.



Nie wyrzucać pojemnika do środowiska

12 L - 10 KG

Producent:

GENETTI ECO S.R.L.S.- 01767/16

Via Goldegg2, 39011 Lana | info@genettieco.com

NAWÓZ WE

ZAWIESINA WAPIENNA Z MANGANEM I
CYNKIEM

Zawiera:

- **32,5%** węglanu wapnia
- **0,5%** siarczanu manganu
- **1,5%** siarczanu cynku

ZATWIERDZONY DLA ROLNICTWA
ORGANICZNEGO

Składniki: Zawiesina wapienna w postaci
naturalnej, sól manganowa, sól cynku.

Neo Cal 560 z wysoką zawartością wapnia
zapobiega wszelkim zaburzeniom równowagi
fizjologicznej i odżywczej owoców i warzyw.

Neo Cal 560 zwiększa wielkość owoców, ich trwałość,
poprawia ich podatność transportową. Wysoką
skuteczność Neo Cal 560 gwarantuje dokładny dobór
składników odżywczych,
jakość i specjalne przetwarzanie.

OWOCE PESTKOWE - Dawka: 5 l/ha - Maksymalne stężenie: minimalna objętość wody 500 l/ha - Okres: do 5
zastosowań, począwszy od brązowienia owocolistków (Gf) i co 10-15 dni podczas fazy wzrostu owoców. Uwaga: Nie
zaleca się stosowania go w ostatnim miesiącu przed zbiorem, ponieważ może pozostawić biały osad na owocach i
liściach.

OWOCE CYTRUSOWE - Dawka: 5 l/ha - Maksymalne stężenie: minimalna objętość wody 1000 l/ha - Okres: 3
zastosowania przed kwitnieniem, bezpośrednio po otwarciu i podczas fazy powiększania owoców.

WINOGRONA (do produkcji wina) - Dawka: 5 l/ha - Maksymalne stężenie: minimalna objętość wody 200 l/ha - Okres:
co najmniej 4 zabiegi o objętości 5 l/ha podczas kształtowania się owoców, zamknięcia gron, rozpoczęcia dojrzewania i
15 dni później; skieruj strumień na grona (produkt nie polecany do stosowania na winogrona stołowe, ponieważ może
pozostawić osad)

POLNE UPRAWY PRZEMYSŁOWE (marchew, itp.) - Dawka: 5 l/ha - Maksymalne stężenie: minimalna objętość wody
150-200 l/ha - Faza: powtarzane aplikacje od fazy 4-6 liści w odstępach 15 dni.
Forma węglanu wapnia zawarta w Actiflow Ca560 może pozostawić białawy osad na owocach, dlatego należy unikać
używania go na winogronach stołowych. Można używać na jabłkach jeśli są one myte po zbiorze.

This is page 26:

Uprawy owocowe: Dawkowanie: 3-4 l/ha: Najwyższe stężenie: Objętość wody co najmniej 300 l/ha.

Okres: Stosować co 7-10 dni po kwitnieniu, do jednego miesiąca przed zbiorem. Przeprowadzić co najmniej 5 aplikacji.

Owoce pestkowe: Dawkowanie: 5 l/ha Maksymalne stężenie: Objętość wody min. 500 l/ha. Okres: do 5 zabiegów, począwszy od brązowienia, a w fazie wzrostu owoców co 10-15 dni. Nie zaleca się stosowania go w ostatnim miesiącu przed zbiorem, ponieważ może pozostawiać białą patynę na owocach i liściach.

Warzywa: 5 l/ha: Najwyższe stężenie: Objętość wody min. 1000 l/ha. Okres: 3 zastosowania przed kwitnieniem, bezpośrednio po kwitnieniu i podczas fazy wzrostu owoców.

Winogrona do produkcji wina: Dawkowanie: Najwyższe stężenie: Objętość wody min. 200 l/ha. Okres: Co najmniej 4 zabiegi z 5 l/ha od początku, przed zamknięciem gron, na początku brązowienia i 15 dni później, należy kierować dysze na winogrona. (Nie zaleca się stosowania na winogronach stołowych, ponieważ może pozostawić osad.)

Uprawy przemysłowe na otwartych polach (marchew, itp.) Dawka: 5 l/ha Maksymalne stężenie: Objętość wody min. 150-200 l/ha. Faza: Powtarzać zabieg od fazy 4-6 liści w odstępach co 15 dni.

Postać węglanu wapnia zawarta w NeoCal 560 może pozostawiać białą powłokę na owocach, dlatego nie należy używać produktu do winogron stołowych. Można używać na jabłkach jeśli są one myte po zbiorze.

Praktyczne zalecenia dotyczące przygotowania mieszaniny opryskowej.

Aby uzyskać optymalny efekt, należy użyć wystarczającej ilości wody na hektar, aby równomiernie spryskać roślinę, nie powodując kapania.

Zaleca się przeprowadzanie zabiegu w temperaturze od 6 do 25°C.

Przed użyciem włącz mieszadło lub mieszalnik, aby uzyskać jednorodną mieszaninę opryskową. Dodaj produkt kiedy beczka będzie do połowy napełniona wodą. Umyj pojemnik dwa razy. W przypadku mieszania z innymi produktami należy zawsze wykonać test i wylać produkt po dodaniu sproszkowanych produktów.



Producent:
GENETTI ECO S.R.L.S. - 01767/16
Via Goldegg 2, 39011 Lana | info@genettieco.com

10 KG

Producent: **GENETTI ECO S.R.L.S. - 01767/16**
Via Goldegg 2, 39011 Lana | info@genettieco.com
GENETTI ECO S.R.L.S. - 01767/16
Via Goldegg 2, 39011 Lana | info@genettieco.com
GENETTI ECO S.R.L.S. - 01767/16
Via Goldegg 2, 39011 Lana



ZEOVITAN



Mineralisches – EG – DÜNGEMITTEL zur Bodenverbesserung ein 100 %iges Natur Produkt

Natürliches ZEOLITH

ZEOVITAN

Für mehr Ertrag und Qualität - 100% Natur

Biologisches Pflanzenhilfsmittel für Landwirtschaft,

Wein-, Obst-, Hopfen-, Erbsen- und Gemüsebau, Garten- und Hobbygartenbau.

Die hervorragenden Eigenschaften von **ZEOVITAN** sind eine Vielzahl von positiven Effekten die Zweckmäßigkeit des Einsatzes von ZEOVITAN als Bodenverbesserer bzw. Bodenkonditionierer:

- Ertragssicherung bez. Steigerung
- Zeolith ist in gewissen Umfang in der Lage das Bakterienwachstum zu reduzieren
- Förderung der Aktivität der nützlichen Mikroflora im Boden einschl. der nitrifizierenden Bakterien
- Erhöhung der Ionenaustauschkapazität des Bodens und damit der Bodenfruchtbarkeit
- Hemmung der Schimmelbildung
- Förderung bodenbürtigen Mikroorganismen, Tiefes und größeres Wurzelsystem.
- Minimierung der Nährstoffverluste und Reduzierung des Verbrauches an Düngemitteln.
- Erhöhung des Wasserhaltevermögens
- pH – Wert Regulierung bzw. puffernde Wirkung
- Bindung von Schwermetallen
- Reduzierung von Nitratgehalt in den landwirtschaftlichen Produkten, Verbesserung ihrer geschmacklichen Eigenschaften und Qualität
- Auf Grund seiner vielfältigen Eigenschaften haben Wissenschaftler **ZEOVITAN** als „intelligentes“ oder sogar „geniales Mineral“ bezeichnet. **ZEOVITAN** verbessert die Fruchtbarkeit vor allem bei sandigen Böden und Böden, die arm an organischem Material sind.
- Es erhöht die Kationenaustausch-Kapazität des Bodens und dank seiner Fähigkeit der selektiven Abgabe von Nährstoffen führt es zu einer verlangsamtten Freisetzung der Nährstoffe. Dadurch wird die Auswaschung ins Grundwasser vermindert.

- Es verbessert die Phosphatlöslichkeit und macht dadurch den Phosphor für das Pflanzenwachstum leichter verfügbar.
- Dank seiner hygroskopischen Eigenschaften erhöht es die Wasserverfügbarkeit des Bodens.
- Durch seine katalytische Aktivität trägt es zur optimalen Sauerstoffversorgung des Wurzelbereichs bei.
- Die regelmäßige Anwendung von **ZEOVITAN** erlaubt mit der Zeit eine drastische Düngerreduzierung. Dies wird durch die Anreicherung des Zeolith im Boden, der wiederum als Nährstoffspeicher fungiert, erreicht.

Anwendung **ZEOVITAN**

1 x pro Jahr / Ausbringung im Frühjahr sofort bei Vegetationsbeginn!

Sonderkulturen (Wein-, Obst-, Hopfen-, Gemüse, Erdbeeren, Kartoffeln usw.) 400 – 500 kg / ha

Ackerbau/Grünlanddüngung 350 – 500 kg / ha

Golf-, Sport- und Reitanlagen 2,5 – 6 kg / m²

Hausgarten, Gemüsebau 2 kg / m²



Entsorgung: Packungen nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Packungen nicht für andere Zwecke wieder verwenden. Packungen mit eventuell anfallenden Produktresten bei Sammelstellen für Haushaltschemikalien abgeben.

Kontakt:

Genetti GmbH
Goldeggerstr. 2-a
39011 Lana (I)
info@genetti.it



Packung: **500 kg**

**Lieferung / Verpackung: Big – Bag und Säcke 25 kg
Korngröße 2 – 4 mm - Trocken lagern!**

Aufwand / Mengenangaben / Mengenangaben - Änderungen / Tippfehler u. Irrtümer vorbehalten.
Aus den Angaben dieser Unterlage (Schriftstück) können keine Ansprüche abgeleitet werden.
Etikette entfernen und unerlaubtes Kopieren sowie Weitergabe sind nicht gestattet.
Zuwendungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000,- € geahndet werden.

Stand 12/2014



**Mineralisches-EG Düngemittel zur Blattdüngung
ein 100 %iges Naturprodukt**

Mineralogie:

Klinophiloit (%) 90, Kalzit, Glimmer, Tonminerale (%) 9-10, Quarz, Feldspat in Spuren, Korngrößenverteilung 0-8 µm.

Das Wirkungsspektrum von ZEOVITAN-BLATT sorgt dafür, dass genau so viel an Nährstoffen abgegeben wird, wie die Pflanze gerade benötigt. Der mineralische Blattdüngung wird sowohl vorbeugend als auch nach Bedarf direkt auf die Pflanzenblätter eingebracht, um einen Nährstoffmangel in bestimmten Phasen des Pflanzenwachstums auszugleichen.

- Ertrags- und Qualitätssteigerung
- Höhere Stressresistenz gegen Hitze und Trockenheit
- Erhöhte Resistenz gegen Herbivoren, Pilz und Schimmel
- Verbesserte Standfestigkeit
- Erhöhte Lagerfähigkeit
- Einsparung von konventionellen Düngern und Pflanzenschutzmitteln.

Anwendung / Mischbarkeit:

ZEOVITAN-BLATT ist mit den gängigen Pflanzenschutzmitteln mischbar. Doch jedoch nicht alle in der Praxis auftretenden Zufälle voraussehbar sind, ist in jedem Fall ein Mischversuch mit kleinen Mengen der für die Spritzung vorgesehenen Produkte zweckmäßig.

ZEOVITAN-BLAU wird in einem Eimer vermischt, bis sich eine homogene Mischung ergibt. Während der Tank des Sprüngerätes mit Wasser befüllt wird, wird der Eimerinhalt langsam und gleichmäßig unter ständigem Rühren in den Spritztank gegeben. Die Anwendung soll nicht bzw. innerhalb von 3 – 4 Stunden nach Regen erfolgen, damit das Produkt auf dem Blatt wirken kann. Am besten morgens oder abends anwenden. Nicht unter direkter Sonneneinstrahlung anwenden!

Bei längerer Stehzeit kann sich der Blattdünger im Wasser absetzen. Um dies zu vermeiden, sollte das Rührwerk entweder nicht ausgeschaltet werden. Nach Gebrauch muss die Spritze gründlich ausgewaschen werden, um eine eventuelle Verstopfung zu vermeiden! Unterliegende Düsen nach der Reinigung entfernen, damit vorhandene Reststoffe auslaufen können. Produkt kühl und Trocken lagern.

!!! ZEOVITAN-BLATT nicht während der Blütezeit verwenden !!!

[illegible]

Entsorgung: Packungen nur völlig restleert der Wertstoffsammlung zuführen; Packungen nicht für andere Zwecke wieder verwenden. Packungen mit eventuell anfallenden Produktresten bei Sammelstellen für Haushaltschemikalien abgeben.

Kontakt:

Genetti GmbH
Goldegstr. 2-a
39011 Lana (T)
info@genetti.it



Packung: **15 kg**

Aufwand / Mengenangaben / Mengenangaben - Änderungen / Tippfehler u. Irrtümer vorbehalten.
Aus den Angaben dieser Unterlage (Schriftstück) können keine Ansprüche abgeleitet werden.
Erlaubte Entnahmen und unerlaubtes Kopieren sowie Weitergabe sind strafbar.
Zuwerdungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000,- € geahndet werden.

Received 11/20/03



Fosfogen

Płynny nawóz

SKŁADAJĄCY SIĘ Z FOSFORU, EKSTRAKTÓW ROŚLINNYCH, MIKROELEMENTÓW I ELEMENTÓW ŚLADOWYCH.

Działanie rozruchowe z szybką absorpcją fosforu. Z kwasowym pH. Wydłuża cykl limfatyczny rośliny i aktywuje naturalne fitoaleksyny.

CHARAKTERYSTYKA I WŁAŚCIWOŚCI

Fosfogen jest płynnym nawozem zawierającym związki chemiczne fosforu, cynku, manganu i potasu. Mają one tę zaletę, że charakteryzują się większą trwałością w glebie i większą przyswajalnością w liściach, nawet w niższych temperaturach. Organiczny składnik roślin przyczyniający się do oszczędzania energii wydatkowanej przez rośliny w procesie fosforanowania.

- Szybka absorpcja fosforu
- Niższa dawka
- Większa odporność na buforowanie
- Źródło energii dla roślin

Fosfogen jest w stanie przeprowadzić szybkie korekty niedoborów nawet w poważnych przypadkach. Szybki pobór fosforu przez błonę komórkową korzeni. Działanie rozszerzające, a w konsekwencji lepsze przyswajanie fosforu i innych składników odżywczych.

Lepszy rozwój wegetatywny, kwitnienie, dojrzewanie.

Pozwala na migrację składników odżywczych do naczyń rośliny, nawet przy zaburzeniach przepływu limfy, uwydatnionych przez nieprawidłowości fizjologiczne.

Polepsza zaopatrzenie rośliny w składniki odżywcze i gwarantuje wyższą produkcję. Unikalna formuła gwarantuje wysoką kompatybilność i szybką asymilację w tkankach roślinnych, dzięki niskiej masie cząsteczkowej i wartości pH podobnej do komórek. Aktywuje naturalne mechanizmy obronne dzięki działaniu biologicznej ochrony przed stresem i zmianami środowiskowymi. Produkt jest wchłaniany przez liście i korzenie i pozostaje w strefie korzeniowej przez około 2 tygodnie.

SKŁAD:

Kwas fosforowy p/p
rozpuszczalny w wodzie 25%
tlenek potasu
rozpuszczalny w wodzie 5%

cynk (Zn)
rozpuszczalny w wodzie 0,1%

miedź (Cu)
rozpuszczalna w wodzie 0,1%

mangan (Mn)
rozpuszczalny w wodzie 0,1%
węgiel (C)
pochodzenia biologicznego 3%

APLIKACJE I DAWKOWANIE:

Uprawa

Nawożenie dolistne
Uprawy owocowe

Okres stosowania

Fertygacja
Początek pączkowania lub przesadzanie 1-2,5 kg/ha 5-25 kg/ha

Dawki

śliwki, morele, czereśnie,
małe owoce, truskawki,
kiwi.

cytrusy, oliwki

gruszki, jabłka, brzoskwinie, przez cały cykl produkcyjny 5-6 razy

winogrona stołowe i winogrona do produkcji wina.	Początek pączkowania, faza poprzedzająca kwitnienie	1-3,5 kg/ha	10 - 25 kg/ha
Warzywa w uprawie polowej i przemysłowej	Po przesadzeniu, faza poprzedzająca kwitnienie	2-3,5 kg/ha	5-25 kg/ha
Uprawy szklarniowe	Po przesadzeniu, faza	0,5-1,5 kg/ha	1-1,5 kg/1000m ²

Producent:

Genetti ECO vGmbH | Goldeggstraße 2 | I-39011 Lana (BZ) | info@genettieco.com



SORB WATER

WASSERRESERVIERUNG FÜR IHRE PFLANZEN Mit 5 LT / 50 LT

Chroni rośliny przed nadmiarem wody, && Oszczędza zasoby wodne. Zatrzymuje wodę w pobliżu korzenia i uwalnia ją zgodnie z potrzebami rośliny. Średniookresowo chroni roślinę przed długimi okresami suszy, wysoką temperaturą lub nadmiernym nawodnieniem

Producent:
Genetti ECO vGmbH
Goldeggstr.2
39011 Lana
info@genetti.it



0637913055966



**Eimer
5 LT**

SORB WATER: Chroni rośliny przed nadmiarem wody, chroni korzenie, zapobiega gniciu. Oszczędzanie zasobów wodnych, lepsze wykorzystanie wody deszczowej, która jest zatrzymywana przez mikrożel w glebie, co pozwala uniknąć bezużytecznego rozpraszania pod powierzchnią gleby (zawsze odnosi się do ilości produktu w glebie). Oszczędności czasu spędzanego na nawadnianiu (czas pomiędzy nawadnianiami wydłuża się). Zatrzymuje składniki odżywcze w pobliżu korzenia i zapobiega wypłukiwaniu składników odżywczych z gleby. Zatrzymuje wodę w pobliżu korzenia i uwalnia ją zgodnie z potrzebami rośliny. Średnio i długookresowo chroni roślinę przed długimi okresami suszy, intensywnego ciepła a także problemami z nawadnianiem. Sposób użycia: współczynnik absorpcji od 1 do 10 razy, 100 ml SORB WATER to 1 litr wchłoniętej wody, posypać glebę w pobliżu łodygi preparatem w ilości 1 drewnianej łęki; można go również zakopać i zmieszać z glebą. && && [Tekst źródłowy nie ma sensu; Użyłem także symbolu i gdzie indziej, gdzie tekst źródłowy nie był zrozumiały...]

PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.

Partia nr 38-

Neues Produkt zur Steigerung von **BRIX** und **Zuckergehalt**
Zur **Blattdüngung** verwenden.
Ideal für sämtliche Kulturen: Erdbeeren, Beeren,
Tafeltrauben, Tomaten, Äpfel usw...

ZUSAMMENSETZUNG
Gesamtstickstoff (N) 2%
Organischer Stickstoff (N) 2%
Wasserlösliches Kaliumoxid (K₂O) 7%
Organische Substanz 24%

SONSTIGE BESTANDTEILE
Phenylalanin, Methionin Monosaccharide und
andere pflanzliche Extrakte wie bspw. Algen + Oxilipine

TECHNISCHE DETAILS
pH (in 1% Lösung) 8,1±0,5
spezifisches Gewicht: 1,33 kg/l

NATÜRLICHER STIMULATOR VON FRUCHTREIFUNG UND BRIX
EG-DÜNGEMITTEL
ZUGELASSEN FÜR DIE BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT

Packung: **6 kg**

Eigenschaften

Fruit-Red eco ist ein Produkt auf Algenbasis des Typs *Ascophyllum Nodosum* und *Macrocladia*, die in den Meeren vor Norðirland vorkommen. Diese Algen werden mit Phenylalanin, Methionin und Monosacchariden angereichert. Dazu kommen weitere, cyclopentanonhaltige Pflanzenextrakte (Oxylipine), die wichtige, an der Fruchtreifung beteiligte Stoffwechselvorgänge aktivieren. Fruit red führt der Pflanze auch den natürlichen Vorläufer der Ethylen-Biosynthese zu – Methionin-, welche für die Reifung und den Anstieg der Zuckerkonzentration in der Frucht (BRIX Wert) verantwortlich ist und die Konsistenz des Fruchtfleischs sowie die Lagerfähigkeit der Frucht nicht beeinträchtigt.

Fruit-Red eco fördert die einheitliche Reifung und Färbung der Frucht und verbessert das Ernteergebnis



Entsorgung:

Packungen nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Packungen nicht für andere Zwecke wiederverwenden. Packungen mit eventuell anfallenden Produktresten bei Sammelstellen für Haushaltschemikalien abgeben.

ANWENDUNG UND DOSIERUNG

KULTUR	ZEITPUNKT	DOSIERUNG
FRÜCHTLICH	2 Anwendungen im Abstand von 8 und 8 Tagen vor der Ernte	4 l/ha
KERNE- UND STREUBER	2 Anwendungen im Abstand von 10 und 7 Tagen vor der Ernte oder 1 Anwendung 7-10 Tage vor der Ernte	5 l/ha 6-8 l/ha
WEIN UND SAFTTRAGEN	2 Anwendungen im Abstand von 10 und 7 Tagen vor der Ernte oder 1 Anwendung 7-10 Tage vor der Ernte	5 l/ha 6-8 l/ha
GEMÜSE IM FREILAND	2 Anwendungen im Abstand von 10 und 7 Tagen vor der Ernte	5 l/ha
GEMÜSE IM GEWÄCHSHAU	2 Anwendungen im Abstand von 10 und 7 Tagen vor der Ernte	4 l/ha
BELOCHN / WASSERBELOCHN	2 Anwendungen im Abstand von 10 und 7 Tagen vor der Ernte	3,5 l/ha
BLUMEN / ZIERPFLANZEN	2 Anwendungen im Abstand von 9-10 Tagen vor Beginn der Blütenverblüdung	250-300ml/100 l Wasser

MISCHBARKEIT

Das Produkt kann mit allen gängigen Pflanzenschutzmitteln gemischt werden mit Ausnahme von kupferhaltigen Präparaten, Mineralölen und Emulsionen.

EG-DÜNGEMITTEL	Nawóz WE
Schnitt; Wassermenge min 200 l	cięcie; min. ilość wody 200 l

Biała tabela:

Achtung! Sicherheitsangaben: H315 Verursacht Hautreizungen P 264 Sorgfältig nach dem Gebrauch abwaschen. P280 Schutzkleidung wie Schutzhandschuhe/Gesichtsschutz / Augenschutz verwenden P302 + P352 Im Falle von Hautkontakt: Sorgfältig mit Wasser und Seife abwaschen. P321 Spezielle Behandlung nicht notwendig. P332 + P313 Im Falle von Hautreizung einen Arzt kontaktieren. P362 Die Kleidung ausziehen gut waschen bevor sie wieder verwendet wird.	Uwaga Informacja dotyczące bezpieczeństwa: H315:Działa drażniąco na skórę P264:Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280:Używać odzież ochronną, taką jak rękawiczki/ochrona twarzy/ochrona oczu P302 + P352 W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dokładnie ręce wodą i mydłem. P321 Specjalne traktowanie nie jest konieczne. P332 + P313 - W przypadku podrażnienia skóry należy skonsultować się z lekarzem. P362 Zdejmij ubrania i dokładnie je wypierz przed ponownym użyciem
--	---



Sulfon-SC-700

Zastosowanie i dawkowanie



WE do szybkiego dolistnego dostarczania S dla uprawy rolnych

Skład: Siarka całkowita: 50% siarki (700 g/l S)
Ciężar właściwy: 1 litr - 1,41 - 1,45 kg
Wartość pH: 4,5 - 6,5
Formulacja: Koncentrat zawiesin (SC)

Skuteczność:

Aby wytworzyć białka, roślina wymaga 1 g siarki na 7 g azotu. Podawanie dawek N bez wystarczającej ilości siarki zakłóca układ odpornościowy roślin i sprzyja rozwojowi chorób grzybiczych i szkodników. Siarka jest łatwo wymywana z gleby i jest bardzo słabo przyswajana w przypadku zimna, deszczu, suszy, zagęszczenia gleby, niekorzystnych wartości pH i słabej penetracji korzeni rośliny. Bezpieczną alternatywą jest dostarczanie jej przez liście.

Sulfon SC-700 ma następujące zalety:

- Bardzo drobne cząstki, a co za tym idzie szybkie wchłanianie
- Płynna forma, dlatego jest bezpyłowy i łatwy w obsłudze
- Wysoce skoncentrowany, ekonomiczny i wydajny

Kontakt:

Genetti Eco v.GmbH
Goldegstr.2-a
39011 Lana (I)
info@genettieco.com

Skład: **10 kg**

Sulfon SC-700 łatwo rozpuszcza się w wodzie i nanosi się go w formie sprayu do ochrony roślin. Można łączyć go z pestycydami i nawozami dolistnymi, a jego tolerancja co do zasady jest bardzo dobra. Jednakże przed użyciem zaleca się przeprowadzenie próby mieszania. Mieszanie AHL i preparatów silnie solnych zazwyczaj nie jest zalecane.

Dla wszystkich upraw: 2 - 10 l/ha do stosowania dolistnego rozpuszczone w co najmniej 300 l/ha wody. Do aplikacji opryskiwaczem plecakowym 0,2 - 1%.
Owoce ziarnkowe: 2 - 4 l/ha po kwitnieniu do czerwca, owoce (dla odmian wrażliwych na mróz, tylko po osiągnięciu wielkości orzecha włoskiego, ale nie w przypadku odmian wrażliwych na siarkę)
Winogrona stołowe: Wielokrotne zastosowanie 3 - 4 l/ha od fazy 3 liści do zamknięcia gron
Winogrona do produkcji wina: Wielokrotne zastosowanie 3 - 4 l/ha od fazy 3 liści do zamknięcia gron
Zboża: 1 - 2 razy 3 - 5 l/ha od początku krzewienia

Kukurydza: 5 l/ha między fazą 4- i 10-ciu liści:

Nasiona rzepaku: 1 - 2 razy 5 - 10 l/ha od fazy 6 liści do rozpoczęcia

kwitnienia

Rośliny strączkowe: 1 - 2 razy 5 - 10 l/ha od fazy 6 liści do rozpoczęcia

kwitnienia

Chmiel: W razie potrzeby aplikacja wielokrotna 0,2-0,4%

Burak cukrowy, rośliny strączkowe, odmiany kapusty: 5 l/ha w fazie 4-6 liści; w przypadku, gdy niedobór jest od umiarkowanego do ciężkiego, powtórz aplikację po 10-14 dniach; min. ilość wody 300 l.

Marchew, cebula, por: 5 l/ha przy wysokości rośliny ok. 15 cm, w przypadku, gdy niedobór jest od umiarkowanego do ciężkiego, powtórz aplikację po 10-14 dniach; min. ilość wody 300 l

Ziemniaki: 5 l/ha około 1 do 4 tygodni po wschodzie; w przypadku, gdy niedobór jest od umiarkowanego do ciężkiego, powtórz aplikację po 10-14 dniach

: min. ilość wody 300 l

Pastwisko: Zastosowanie 5 - 10

l/ha na początku lata; okres

oczekiwania na wypas 3 tygodnie;

NAWOZ WE Ilość wody min

Pastwisko: Produkcja 5 10 l/ha

2 tygodnie przed 1-szym lub 2-gim

cięcie; min. ilość wody 20

Uwaga

Informacja dotycząca

H315:Działa drażniąco na skórę

P 264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.

P280 Używać odzież ochronną, taką jak rękawiczki/ochrona twarzy/ochrona oczu

P302 + P352 W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dokładnie ręce wodą i mydłem.

P321 Specjalne traktowanie nie jest konieczne.

P332 + P313 - W przypadku podrażnienia skóry należy skonsultować się z lekarzem.

P362 Zdejmij ubrania i dobrze je wypierz przed ponownym użyciem.

HARP-X
FIZJOAKTYWATOR DO
POPRAWY WYDAJNOŚCI I
JAKOŚCI UPRAW POPRZEZ
PRZYSPIESZENIE
FOTOSYNTAZY
FIZJOAKTY
WATOR:3,3
o% (3,3
g/l)
Wygląd:
brązowy
gęstość:1,1
4 g/ml
pH:6

Sposób użycia: POMIDORY PRZEMYSŁOWE.

120ml/hl przy sadzeniu i 3-5 razy w
sezonie w odstępach 10-15 dni UPRAWY
POLOWE 120ml/hl
po zasadzeniu lub w sytuacjach awaryjnych
Dla wszystkich rodzajów owoców: Jabłka,
gruszki, kiwi, czereśnie, morele

Dla wszystkich rodzajów zbóż, warzyw i
winogron w sezonie 5-7 razy po fazie
pączkowania i w sytuacjach awaryjnych w
dawce 120 ml/hl lub 1,2 litra/ha.

HARP-X Zwiększa wielkość plonów i działa w
sposób fizjologiczny poprzez stymulację w
celu utrzymania wysokiego standardu jakości
nawet w przypadku upraw zniszczonych z
powodu stresu abiotycznego lub przez
szkodniki. Harp-X działa fizjologicznie,
stymulując siłę roślin.

Nie wyrzucać pojemnika do środowiska



Producent:

GENETTI ECO S.R.L.S. - 01767/16

Via Goldegg 2, 39011 Lana | info@genettieco.com 5 KG

Taene con



3

34

SUBSTANCJA NATURALNEGO POCHODZENIA, KTÓRA CHRONI PRZED STRESEM BIOTYCZNYM I ABIOTYCZNYM

WYGLĄD: skoncentrowany ciemny brązowy płyn
SKŁAD: EKSTRAKT GARBNIKÓW 34% (p/p)
SUBSTANCJA SUCHA: 46% p/p)
Substancja aktywna: Wyciąg z drewna kasztanowego
ekstrahowana fizycznie

Funkcja agronomiczna i rodzaj działania: Działa, aby wzmocnić roślinę i pobudzić układ odpornościowy, wzmacniając metabolizm i mechaniczną samoobronę.

Dawka i zastosowanie: Od 5-10 litrów/ha (500-1000 litrów/ha).

Jest zalecany we wszystkich fazach fenologicznych z wyjątkiem kwitnienia. Wstrząsnąć przed użyciem. Do użytku dolistnego oraz

dokorzeniowego. Środki ostrożności: Nie trzeba podejmować większych środków ostrożności poza stosowaniem się do dawki, wskazań i sposobu stosowania.

Przed użyciem na uprawach należy wykonać test.

Przechowywać produkt w oryginalnym opakowaniu i zużyć w ciągu 2 lat. Chronić przed dziećmi. Przechowywać w suchym, świeżym pomieszczeniu w nieuszkodzonym opakowaniu.

Nie wyrzucać pojemnika do środowiska.

Producent:

GENETTI ECO S.R.L.S. - 01767/16

Via Goldegg 2, 39011 Lana | info@genettieco.com

5 KG

Frostaïd candle anti-frost

Zastosowanie

Aktywne systemy ogrzewania pchronice przed zmroeniem gleby,
odpowiednie dla winnic i sadów

Świece przeciwarzamarzaniowe chroni winnice i wszelkiego rodzaju rośliny
owocowe przed mrozem.

Zmiana klimatu i wzrost temperatury powoduj zwiększone ryzyko wystpienia
pónych przymrozków w rolnictwie.

Świeca 8 godzin

Świeca 14 godzin

Aktywna metoda ogrzewania gleby była testowana przez dziesięciolecia w
obszarach naraonych na to zjawisko.

WaterStopBarrier

Przeciw wszelkiego rodzaju powodziom itp.

Ten worek ma moc ssania do 25 l wody i jest gotowy do użycia w ciągu 3 minut.

Dlaczego warto wybrać Water Barrier:

1. Worek waży mniej niż 800 g.
2. Jego niewielkie wymiary w stanie suchym pozwalają na łatwe przechowywanie.
3. Gotowy do użycia w 3 minuty
4. Mocny: Podwójnie złożony jest bardzo wytrzymały
5. Transport: Rozmiar i waga pozwalają na łatwe transportowanie dużych ilości worków.
6. Sposób użycia: Worki umożliwiają łatwe i szybkie przygotowanie nawet gdy czyni to jedna osoba.
7. Rozmiar: Po napełnieniu rozmiar worka wynosi około 20-25 kg i 40x70x16 cm.
8. Ponowne wykorzystanie

W okresie 3 miesięcy po użyciu worki Water Barrier ulegają odwodnieniu i powracają do swojego pierwotnego rozmiaru i mogą zostać ponownie użyte, nawet do 4-5 razy. Wewnętrzny materiał nie jest szkodliwy i ulega degradacji w 100%.

cleaneco

Przyjazny dla
środowiska działający
cudą środek czyszczący
o 10-krotnym działaniu

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

