



Indice

4	OXICUP500
5	POLTYCUP
6	HYDRO46
7	FOSFOGEN
8	SULFON 700
9	INDIAN NEEM
10	NOPAN
11	BOTRIFEND
12	BIOMITSR
13	NEOCAL500
14	NATURETWINE400
15	ZEOVITAN
16	TECNOCUP6
17	FRUITREDECO
18	KAOLIN100
19	CHEL CUP15
20	ATS KRISTALL90/20
21	CALTOP18
22	DIAMANTPHOS96
23	BORECO19
24	BIOFERR-CHEL9
25	TANNECO34
26	SETIVEG
27	METABAS
28	CELLFORCE SI24
29	BICARBONATODISODIO
30	NEO MAN500
31	FRUMAXSTAR
32	FUNGO STOP
33	SAPONE MOLLE
34	KIESELGUR CRYSil SC
35	KIESELGUR CRYSil P

Oxicup^{eco}500

CONCIME CE

Ossicloruro di rame

Rame (Cu) totale.....50 %

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto.

Non superare le dosi appropriate

CONSENTITO IN AGRICOLTURA

BIOLOGICA

Materie prime: **Ossicloruro di rame**

Il rame, essenziale per la vita di tutte le piante, ha funzioni prevalentemente catalitiche, e il suo ruolo nel metabolismo vegetale è spesso complementare a quello del ferro. E' un elemento polivalente che prende parte attiva ai fenomeni di ossidoriduzione ed è anche un costituente di importanti enzimi come la fenolasi (mono e polifenolossidasi), la laccasi e l'ossidasi dell'acido ascorbico. E' ritenuto necessario anche per la sintesi della clorofilla e contribuisce alla stimolazione delle difese naturali delle piante dai parassiti. La carenza di rame si manifesta con ingiallimenti e formazione di macchie sui lembi fogliari.

Il prodotto va utilizzato per concimazione foliare .

COLTURE DA FRUTTO (MELO, PERO, PESCO, CILIEGIO, ALBICOCCO, SUSINO) E VITE: utilizzare 1,4-1,8 kg/ha sciolti in 500-700 lt di acqua.

Olivo: utilizzare 1,60-2,20 kg/ha sciolti in 500-700 lt di acqua.

FRAGOLA E COLTURE ORTIVE INCLUSO IL FINOCCHIO:

utilizzare 1,8-2,2 kg/ha diluiti in 500-700 lt di acqua.

COLTURE DI PIENO CAMPO (BARBABIETOLA, CEREALI, RISO, TABACCO): utilizzare 1-1,4 kg/ha diluiti in 400-600 lt di acqua

NON EFFETTUARE APPLICAZIONI DURANTE LA FIORITURA

Non miscelare con prodotti a reazione alcalina .

Prima di effettuare miscele con fitofarmaci o concimi, effettuare una prova di compatibilità

PERICOLO

Contiene Ossicloruro di rame
(n. indice 029-017-00-1)

Tossico se ingerito. Nocivo se inalato. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non disperdere nell'ambiente. Indossare guanti/indumenti protettivi / Proteggere gli occhi/il viso.
IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un medico. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni nazionali



non disperdere il contenitore nel ambiente



Produttore:

GENETTI ECO S.R.L.S. - 01767/16

Via Goldegg 2, 39011 Lana | info@genettieco.com

10KG

PoltyCup^{eco}



CONCIME CE

Miscela di microelementi boro (B) (sodio) e rame (Cu) (solfato)

Boro (B) solubile in acqua.

.0,2%

Rame (Cu) solubile in acqua.20%

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate

CONSENTITO IN AGRICOLTURA

BIOLOGICA

Materie prime: **borato di sodio, sale di rame (Solfato)**

BIO



Il Boro e rame sono elementi essenziali per la vita di tutte le piante e sono frequentemente carenti nei terreni italiani. Il boro è necessario per la germinazione del polline, per la formazione dei fiori, dei frutti e delle radici per il trasporto degli idrati di carbonio all'interno delle piante e per l'assorbimento dei cationi, in particolare del calcio. Le carenze sono frequenti soprattutto nei terreni alcalini e/o poveri di sostanza organica. Il rame ha funzioni prevalentemente catalitiche e prende parte attiva ai fenomeni di ossidoriduzione ed è anche un costituente di importanti enzimi. Le piante carenti di boro e/o rame sono più sensibili agli attacchi parassitari.

Il prodotto va utilizzato per concimazione foliare .

COLTURE DA FRUTTO (MELO, PERO, PESCO, CILIEGIO, ALBICOCCO, SUSINO) E VITE: utilizzare 2,8 -3,3 kg/ha sciolti in 500-700 lt di acqua.

Olio: utilizzare 3,5-4,0 kg/ha sciolti in 500-700 lt di acqua.

FRAGOLA E COLTURE ORTIVE INCLUSO IL FINOCCHIO:

utilizzare 2,5-3,5 kg/ha diluiti in 500-700 lt di acqua.

COLTURE DI PIENO CAMPO (BARBABIETOLA, CEREALI, RISO, TABACCO): utilizzare 2,0-4,0 kg/ha diluiti in 400-600 lt di acqua

NON EFFETTUARE APPLICAZIONI DURANTE LA FIORITURA

Non miscelare con prodotti a reazione alcalina .Prima di effettuare miscele con fitofarmaci o concimi, effettuare una prova di compatibilità

PERICOLO

Contiene Solfato di rame pentaidrato

(n. indice 029-023- 00-4)

Nocivo se ingerito.

Provoca gravi lesioni

oculari. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Tenere fuori dalla portata dei bambini. IN CASO DI

CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le

eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare Non disperdere nell'ambiente.

Indossare guanti/indumenti protettivi / Proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVENI o un medico.



Produttore:

GENETTI ECO S.R.L.S. - 01767/16

Via Goldegg 2, 39011 Lana | info@genettieco.com



non disperdere
il contenitore
nell'ambiente

5KG

ecokup hydro 46

CONCIME CE

Idrossido di Rame

Rame (Cu) totale.....46 %

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto.

Non superare le dosi appropriate

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Materie prime: **Idrossido di rame**

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO:

Il prodotto va utilizzato per concimazione foliare .

Culture da frutto (melo, pero, pesco, ciliegio, albicocco, susino) e vite: utilizzare 1,0-1,4 kg/ha sciolti in 500-700 lt di acqua.

Olivo: utilizzare 1,20-1,80 kg/ha sciolti in 500-700 lt di acqua.

Fragola e culture ortive incluso il finocchio:

utilizzare 1,30-1,90 kg/ha diluiti in 500-700 lt di acqua.

Culture di pieno campo (barbabietola, cereali, riso,

tabacco): utilizzare 0,70-1,2 kg/ha diluiti in 400-600 lt di acqua

NON EFFETTUARE APPLICAZIONI

DURANTE LA FIORITURA.

MISCIBILITA': Non miscelare con prodotti a reazione alcalina .

Prima di effettuare miscele con fitofarmaci o concimi, effettuare una prova di compatibilità.

prodotto di libera vendita

L'idrossido è la molecola più raffinata del rame, elemento essenziale per la vita di tutte le piante; ha funzioni prevalentemente catalitiche e il suo ruolo nel metabolismo vegetale è spesso complementare a quello del ferro. È un elemento polivalente che prende parte attiva ai fenomeni di ossidoriduzione ed è anche un costituente di importanti enzimi come la fenolasi (mono e polifenolossidasi), la laccasi e l'ossidasi dell'acido ascorbico. È ritenuto necessario anche per la sintesi della clorofilla e contribuisce alla stimolazione delle difese naturali delle piante dai parassiti.

Il contenuto in rame nei vegetali oscilla da 2,5 a 3,5/kg sulla sostanza secca e in una stessa pianta le quantità maggiori si trovano nei tessuti metabolicamente più attivi come le foglie giovani e le gemme. Il rame è presente nel suolo come catione di scambio o come sale basico. L'assorbimento del rame nelle piante avviene sotto forma di elemento bivalente sia come ione semplice che come ione complesso organico. Il terreno ha un forte potere di ritenzione per il rame. In ambiente alcalino e in presenza di abbondante sostanza organica il rame è reso meno biologicamente disponibile in seguito alla formazione di composti molto insolubili. La carenza di rame si manifesta con ingiallimenti e formazione di macchie sui lembi fogliari. I sintomi sono specifici soprattutto per le pomacee i segni delle carenze di rame sono evidenziati da caratteristiche atrofie dei giovani getti. Le carenze di rame sono più frequenti nei terreni ricchi di sostanza organica, oppure in quelli con reazione alcalina.

Distributore:

GENETTI ECO S.R.L.S. - 01767/16

Via Goldegg 2, 39011 Lana | info@genettieco.com

1 KG




Non disperdere
il contenitore
nell'ambiente

PRODOTTO SOGGETTO A CALO PESO

PERICOLO

Contiene Idrossido di rame (n. indice 029-02-00-3)

Letale se inalato. Nocivo se ingerito. Provoca gravi lesioni oculari. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Evitare di respirare la polvere. Non disperdere nell'ambiente. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso IN CASO DI INGESTIONE: in presenza di malessere contattare un medico. IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni nazionali.



eco FOSFOGEN



Composizione

Anidride fosforica (P2O5)
solubile in acqua 25 %
Ossido di Potassio (K2O)
solubile in acqua 5 %
Zinco (Zn)
solubile in acqua 0,1 %
Rame (Cu)
solubile in acqua 0,2 %
Manganese (Mn)
solubile in acqua 0,1 %
Carbonio Organico (C)
di origine biologica 3 %

CARATTERISTICHE E VANTAGGI, MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO

FOSFOGEN è un concime liquido contenente fosforo zinco, manganese e potassio attivi chimicamente legati, i quali offrono il vantaggio di avere una maggiore persistenza nel terreno ed una maggiore assimilabilità fogliare, anche a basse temperature; la componente organica vegetale contribuisce ad un risparmio energetico da parte della pianta nei processi di fosforilazione.

- Veloce assorbimento del fosforo
 - Minore dosaggio di impiego
 - Maggiore resistenza alla retrogradazione
 - Fonte di energia per la pianta
- FOSFOGEN è in grado di correggere velocemente stati di carenza anche nei casi più gravi. Rapido assorbimento del Fosforo da parte delle membrane cellulari delle radici. Azione vaso-dilatatrice e conseguente migliore assimilazione del Fosforo e degli altri elementi nutritivi.
- Migliora lo sviluppo vegetativo, la fioritura, l'allegagione e la maturazione.

- Permette agli elementi nutritivi di traslocare nei vasi conduttori anche in presenza di interruzione del flusso linfatico dovuto ad anomalie fisiologiche.
- Migliora lo stato nutrizionale delle piante, garantendo una maggiore produzione.
- Questo particolare tipo di formulato assicura un alto livello di compatibilità e una rapida assimilazione nei tessuti vegetali, grazie al basso peso molecolare del complesso e ad un valore di pH simile a quello cellulare. Attiva la formazione di sostanze naturali di resistenza con azione indotta di protezione biologica nei confronti di stress e avversità ambientali. Il prodotto è assorbito per via fogliare e radicale, permanendo nella zona delle radici per circa due settimane

DOSI CONSIGLIATE:

FRUTTICOLE

(pero, melo, pesco, susino, albicocco, ciliegio, piccoli frutti, fragola, kiwi, agrumi, olivo)

Dalla ripresa vegetativa o trapianto, per tutto il ciclo produttivo, 3 – 6 volte 1 – 2,5 Kg/ha 5 – 25 Kg/ha

VITE DA VINO E DA TAVOLA

ritura e durante tutto il ciclo,

3 – 4 volte 1 – 3,5 Kg/ha 10 – 25 Kg/ha

ORTICOLE di pieno campo e INDUSTRIALI e durante tutto il ciclo, 3 – 4 volte 2 – 3,5 Kg/ha 5 – 25 Kg/ha

COLTURE IN SERRA, e durante tutto il ciclo, 3 – 6 volte 0,5 – 1,5 Kg/ha 1 – 1,5 Kg/1000 m²



Non disperdere il contenitore nell'ambiente

Distribuito da:

GENETTI ECO S.R.L.S. - 01767/16
Via Goldegg 2, 39011 Lana | info@genettieco.com

5KG

Sulfon^{eco}700

Sulfon-SC-700 è un concime CE, liquido per la rapida fornitura di colture agricole attraverso la foglia

composizione:

S - totale: 50% di zolfo (700 g / l S)

Peso specifico: 1 litro - 1,41 - 1,45 kg

Valore del pH: 4,5 - 6,5

Formulazione: sospensione concentrata (SC)

PRODOTTO DI LIBERA VENDITA

Effetto: per produrre proteine, la pianta ha bisogno di 1 g di zolfo per 7 g di azoto. Gli integratori di N senza uno zolfo disponibile sufficiente interrompono il sistema immunitario delle piante e

promuovono le malattie fungine e le infestazioni da parassiti. Lo zolfo è facile da filtrare nel terreno e può essere usato molto male in periodi freddi, umidi, secchi, compattazione del suolo, livelli di pH sfavorevoli e radicazione della pianta. L'alternativa sicura è la fornitura tramite il foglio. Sulfon-SC-700 presenta i seguenti vantaggi: - Super particelle fini, quindi assorbimento veloce - liquido, quindi senza polvere e maneggevolezza - Altamente concentrato, economico ed economico

Sulfon-SC-700 è facilmente solubile in acqua, è applicato per mezzo di spray di protezione delle

colture. La combinazione con pesticidi e fertilizzanti fogliari è possibile e la tollerabilità in generale è molto buona. Tuttavia, un campione misto deve essere eseguito prima dell'uso. La miscela con AHL e preparazioni fortemente saline è generalmente scoraggiata. In tutte le colture: 2 - 10 l / ha per l'applicazione fogliare in almeno 300 l / ha di acqua. Per applicazione con siringa a zaino 0,2 - 1%. Frutto di pisello: 2 - 4 l / ha dopo la fioritura fino a giugno (nel caso di varietà suscettibili di ruggine solo dalla dimensione della noce, non in varietà sensibili allo zolfo) Uve: Diverse applicazioni con 3 - 4 l / ha da fase a 3 foglie a grappoli d'uva Uve: diverse applicazioni con 3 - 4 l / ha da 3 fasi fino alla vendemmia Cereali: 1 - 2 volte 3 - 5 l / ha dall'inizio della crescita

Mais: 5 l / ha tra 4 e 10 foglie: Colza: 1 - 2 volte 5 - 10 l / ha da 6 foglie a fioritura precoce

Legumi: 1 - 2 volte 3 - 5 l / ha da 6 foglie fino all'inizio della fioritura

Luppolo. Applicazioni multiple con 0,2-0,4% quando necessario

Barbabietola da zucchero, legumi e cavoli: 5 l / ha nella fase 4-6 foglia; se medio-severo, ripetere la

procedura dopo 10 - 14 giorni; Quantità di acqua min. 300 l. Carote, cipolle, porri: 5 l / ha ad

un'altezza di circa 15 cm, in carenze medio-grandi ripetere

l'applicazione dopo 10 - 14 giorni;

Quantità di acqua min. 300 l

Patata: 5 l / ha circa da 1 a 4 settimane dopo l'emergenza; in caso di carenza medio-grave, ripetere

l'applicazione dopo 10 - 14 giorni: quantità di acqua min. 300 l

Pascolo: 5 - 10 l / ha di applicazione all'inizio dell'estate; Tempo di attesa per il pascolo di 3

settimane; Quantità di acqua min. 200 l di prato: 5 - 10 l / ha di applicazione 2 settimane prima del 1 °

o 2 ° taglio; Quantità di acqua minima 200 l

attenzione

Informazioni di sicurezza:

H315 Provoca irritazione cutanea

P 264 Lavare accuratamente dopo l'uso.

P280 Usare indumenti protettivi come guanti protettivi Protezione facciale / occhi

P302 + 352 In caso di contatto con la pelle: lavare con acqua e sapone.

P321 Trattamento speciale non necessario. P332 + P313 In caso di irritazione della pelle, contattare

un medico. P362 Togliti i vestiti prima di lavarli di nuovo. Contatto: Genetti Eco v.GmbH Goldeggstr. 2-a

39011 Lana (I) info@genettieco.com



Non disperdere il contenitore nell'ambiente

Produttore:

GENETTI ECO S.R.L.S. - 01767/16

Via Goldegg 2, 39011 Lana | info@genettieco.com

10KG



CORROBORANTE DI ORIGINE VEGETALE A BASE DI AZADIRACHTA INDICA

INDIAN NEEM



COMPOSIZIONE

- Estratto vegetale di NEEM
- Emulsionanti

INDIAN NEEM è un olio vegetale ottenuto dalla spremitura a freddo dei semi di Azadirachta Indica, appartenente alla famiglia delle Meliacee; Il NEEM è conosciuto in tutto il mondo per le sue straordinarie proprietà e le sue molteplici applicazioni. Il prodotto non per uso umano o cosmetico, può essere utilizzato come coadiuvante per uso agricolo attraverso applicazioni fogliari eradicanti. Si consiglia di agitare il prodotto prima del suo utilizzo. Durante l'applicazione del prodotto continuare il processo di agitazione fino a utilizzo completato. Il prodotto tende a solidificarsi in presenza di temperature al di sotto di 8 °C.

Per ritornare al suo stato di utilizzo si consiglia di riscaldare il prodotto in acqua calda o immagazzinarlo a temperature superiori a 15 °C.

FORMULAZIONE

Liquido, Colore giallo

COLTURE	APPLICAZIONE	DOSI
Ortaggi a frutto	Fogliare Radiale	300 – 500 ml/100 lt d'acqua; 400 – 500 ml/1000 m²
Ortaggi a foglia	Fogliare Radiale	300 – 500 ml/100 lt d'acqua; 400 – 500 ml/1000 m²
Vite	Fogliare Radiale	300 – 500 ml/100 lt d'acqua; 400 – 500 ml/1000 m²
Drupacee	Fogliare Radiale	300 – 500 ml/100 lt d'acqua; 400 – 500 ml/1000 m²
Pomacee	Fogliare Radiale	300 – 500 ml/100 lt d'acqua; 400 – 500 ml/1000 m²

Uso non alimentare.

Consigli di prudenza e conservazione del prodotto:

- Conservare a temperatura tra 0° e 25°.
- Tenere lontano da alimenti e bevande.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo il suo utilizzo.
- Agitare il f acone prima del suo utilizzo

In caso di contatto con gli occhi e con la pelle lavare abbondantemente con acqua.

250 ml

GENETTI ECO
green farming

Produttore: GENETTI ECO S.R.L.S.
Via Goldegg 2, 39011 Lana (BZ)
info@genettieco.com
www.genettieco.com

ESTRATTO FLUIDO DI LIEVITO CONTENENTE ALGHE BRUNE

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Composizione:

Azoto (N) organico 1%

Carbonio (C) organico di origine biologica 10%
pH = 6

Sostanza organica con peso molecolare
<50kDa 30%

CARATTERISTICHE BIOAGRONOMICHE:

Nopan è un fertilizzante innovativo che attiva tutti i meccanismi metabolici della pianta, ottenuto da un esclusivo processo degli ammendanti vegetali presenti.

Nopan si può utilizzare in tutte le fasi fenologiche nei cereali, in frutticoltura solo dopo la fioritura favorendo l'ingrossamento del frutto, in orticoltura dopo 20-25 giorni dal trapianto. Va applicato con temperature medio alte in quanto il prodotto si deve asciugare rapidamente, va applicato con foglia asciutta.



Nopan^{eco}

Prodotto da: Genetti ECO vGmbH |
Goldeggstraße 2 | I-39011 Lana (BZ) | info@genettieco.com

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO:

Tipo di applicazione:

Il prodotto trova applicazione su:

VITE 300 gr/hl 500-600 lt acqua/ha

DRUPACEE/POMACEE: 300 gr/hl 700-800 lt acqua/ha

ORTICOLE: 250-300 gr/hl 500-700 lt acqua/ha

Orticole in serra 300 gr/hl 100 lt acqua/ 1000mq

CEREALI: 300-400 gr/hl 200-300 lt acqua/ha

Pomodoro Ind. 300 gr/hl 500 lt acqua/ha

Agrumi 300 gr/hl 700-800 lt acqua/ha

Si consiglia di applicare con temperature superiori ai 25 gradi e nelle ore più calde del giorno.

Nelle piante da frutto, si inizia dopo la fioritura a ingrossamento frutto in poi, si consiglia intervalli da 7-10 giorni uno dall'altro.

MISCIBILITA': CON TUTTI I FITOFARMACI ESCLUSO IL RAME-ZOLFO-CAPTANO, OLII MINERALI E VEGETALI.

SI CONSIGLIA L'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO DA SOLO ONDE MODIFICARE L'EFFICACIA

Non disperdere il contenitore nell'ambiente

 **1KG**

Botrifend^{eco}

Botrifend

Prodotto ad azione specifica: *Bacillus subtilis*, *B. licheniformis*, *B. amyloliquefaciens*, *B. megaterium*, *B. pumilus*, *B. simplex*. Prodotto nutrizionale con azione specifica che agisce sui processi fisiologici della pianta e le permette di crescere vigorosa anche in presenza di funghi fitopatogeni (*Botrytis* spp., *Monilia* spp., *Sclerotinia* spp., *Pythium* spp., *Rhizoctinia* spp., *Didymella* spp., etc.) Batteriosi, Virus che limitano la produttività delle colture. Assicura una rapida ripresa vegetativa, la rigenerazione dei tessuti ed il corretto sviluppo delle colture.

Vantaggi:

- Stimola i processi fisiologici di ISR (Induced Systemic Resistance)
- Incrementa l'attività enzimatica di frutti, fiori, foglie e radici
- Incrementa l'attività metabolica in presenza di funghi, batteri e virus
- Efficace a temperature comprese tra 10° e 37°C.
- Efficace in un ampio spettro di condizioni ambientali
- Rapida azione, risultati visibili dopo 12/24 ore
- *Bacillus subtilis*, *B. licheniformis*, *B. simplex*, *B. amyloliquefaciens*, *B. megaterium*, *B. pumilus* 1x10(8) CFU/ml
- Nutrienti organici 2-3%
- pH: 6-7

Densità: 1,05 g/ml

Colore: marrone scuro

Tipo di applicazione

Il prodotto agisce sul metabolismo delle piante perciò, per ottenere i migliori risultati, è necessaria un'accurata applicazione.

Per applicazioni fogliari:

il range di temperatura ottimale è 18°-28°C. Applicare nelle ore del giorno che assicurino le condizioni migliori (con alte temperature durante il giorno applicare alla sera; con temperature molto basse di notte applicare al mattino).

Per applicazioni radicali: il range di temperatura del suolo ottimale è 15°-28°C. Applicare su terreno umido non impiegare elevati volumi di acqua al fine di evitare il dilavamento. Miscelare un concime ricco di sostanza organica (ad es. cuniccio o borlanda 2-3 kg/ha).

Thermasave mantiene la sua massima efficacia sull'apparato fogliare per 5/7 giorni.

Ortaggi in serra Applicazione fogliare: 200-250 ml/hl (min. 2 L/ha), ogni 7/15 giorni se necessario.

Applicazione radicale: 2,5 L/ha, al trapianto (semina) e ripetere dopo 15 giorni a 1,5 L/ha, applicare ogni 20 giorni se necessario.

Ortaggi in pieno campo

Applicazione fogliare: 250-300 ml/hl (min. 2,5 L/ha), ogni 7/15 giorni se necessario.

Applicazione radicale: 2,5-3,0 L/ha, al trapianto (semina) e ripetere dopo 15 giorni a

1,5 L/ha, applicare ogni 20 giorni se necessario.

Frutticole

Applicazione fogliare: 200-300 ml/hl (min. 2,5 L/ha), in piena fioritura ed in pre-raccolta se necessario.

Applicazione radicale: 1,5 L/ha, al trapianto (germogliamento) e ripetere dopo 30 giorni a 1,5 L/ha.

Vite e uva da tavola

Applicazione fogliare: 250-300 ml/hl (min. 2,5 L/ha), in pre-chiusura grappolo,

invaiaatura ed in pre-raccolta se necessario.

Floricole, ornamentali, tappeti erbosi

Applicazione fogliare: 250-300 ml/hl (min. 2,5 L/ha), ogni 7/15 giorni se necessario.

Applicazione radicale: 2,5-3,0 L/ha, al trapianto (semina) e ripetere dopo 15 giorni a

1,5 L/ha, applicare ogni 20 giorni se necessario.

Importante

Per la migliore efficacia, con applicazioni fogliari, è necessario:

- Assicurare la completa e uniforme bagnatura della vegetazione
- Acidificare la sospensione a pH 6,0

Non applicare in caso di vento

Importante

Per la migliore efficacia, con applicazioni radicali, è necessario:

- Applicare su terreno umido non impiegare elevati volumi di acqua al fine di evitare il dilavamento

- Miscelare un concime ricco di sostanza organica (ad es. cuniccio o borlanda 2-3 kg/ha)

Miscibilità- Il prodotto è generalmente compatibile con concimi, insetticidi, acaricidi, nematocidi e fungicidi eccetto prodotti fortemente acidi (pH <3) o alcalini (pH >8.5). Per assicurare la migliore efficacia si raccomanda di non miscelare con prodotti rameici e di distanziare le applicazioni di almeno 48/72 ore. Si raccomanda sempre di effettuare

test delle miscele sulle colture prima di un impiego su larga scala.

non disperdere il contenitore nel ambiente



Produttore: Genetti ECO vGmbH |
Goldeggstraße 2 | I-39011 Lana (BZ) | info@genettieco.com

5KG

eco BIOMIT SR

BIOMIT SR

Concime CE

Miscela di microelementi

Composizione in g/l

Cobalto (Co) 0,2

Manganese

Molibdeno (Mo) 0,2

Zinco (Zn) 14,24

Miscelati ai seguenti mesoelementi:

Zolfo (S) 28,96

Calcio (Ca) 176,32

Magnesio (Mg) 92,96

Calcio e Magnesio sono ottenuti dalla polverizzazione di una particolare roccia dolomitica.

Consentito in agricoltura biologica

Formulazione: Fluido solubile in acqua con densita' (kg/dm³) e pH 5,5 (in sospensione acquosa al 10 %).

Caratteristiche: Biomit SR e' un prodotto esclusivamente fogliare per la prevenzione delle carenze nutrizionali e degli squilibri fisiologici delle piante.

I suoi componenti favoriscono lo sviluppo vegetativo della pianta, il miglioramento qualitativo del frutto e della sua serbevolezza ed una sensibile riduzione dei trattamenti a base di fitosanitari.

L' utilizzo costante durante il periodo vegetativo ha un effetto protettivo, anche meccanico, nei confronti degli agenti abiotici.

Non contiene solfiti.

Modalita' e dosi d' impiego per l' intero periodo di coltura:

Normalmente le irrorazioni con 10l/ha di Biomit SR vengono alternate a quelle con 5 l/ha

Pomacee e drupacee 50/80l/ ha Dal rigonfiamento gemme.

Importante

sono le tre irrorazioni in fioritura (inizio, meta' e fine).

Vite 50/90l/ ha Dall inizio della ripresa vegetativa

Actinidia 50/80 l/ha ogni 45 giorni dalla ripresa vegetativa.

Orticoltura 30/40 l/ha Con irrorazione iniziale su piantine prima del trapianto (vedi pomodoro da industria).

Per le brassicacee (cavoli) liliacee (cipolla, aglio e porro) e' consigli l' impiego con un

prodotto adesivante.

Culture industriali: 25 l/ha con 5l/ha su prime foglie aperte, 10l/ha

Cereali (frumento, mais, riso ecc.) alla levata tra il primo e secondo nodo e

10l/ha alla spigatura con spiga gia emersa.

Soia 10 l/ha A meta sviluppo dopo ogni taglio

Cucurbitacee (melone, zucchine ecc. 30/40 l/ha Irrorazione preventiva su piantine prima

del trapianto (vedi pomodoro)

Pomodoro 50/80 l/ha Irrorazione preventiva prima del trapianto con Biomit SR miscelato con acqua al 5%.

Le irrorazioni devono esser fatte per tutto il periodo vegetativo per mantenere coperti i palchi.

Miscibilita': Biomit SR e' miscibile con i principali fitosanitari con l' esclusione dei prodotti contenenti alluminio (ad es.: Fosetil alluminio).

Avvertenze: Durante l' irrorazione mantenere sempre in funzione nell' atomizzatore l' impianto di agitazione affinche' la parte piu' solida del prodotto non si depositi.

Pressione di irrorazione minima: 3 atmosfere.

Per i prodotti destinati al consumo fresco e non lavati nel post-raccolta, per evitare che la dolomite

lasci sui frutti piccole tracce, interrompere le irrorazioni 20/25 giorni prima della raccolta e/o irrorare

con una concentrazione di Biomit SR pari a 1,5%/1,8%.

I tecnici della societa' sono a disposizione per qualsiasi chiarimento sulle funzioni e l' utilizzo di Biomit SR.

non disperdere il contenitore nel ambiente



Prodotto da:

Peragros srls

Via Romeo 33

30034 Mira (Venezia)

Tel: 041-698438

5KG

BIOMIT

Concime CE

Miscela di microelementi

Composizione in g/l

Cobalto	(Co)	0,2
Manganese	(Mn)	12,64
Molibdeno	(Mo)	0,2
Rame	(Cu)	13,12
Zinco	(Zn)	11,52

Miscelati ai seguenti mesoelementi:

Zolfo	(S)	28,96
Calcio	(Ca)	176,32
Magnesio	(Mg)	92,96

Calcio e Magnesio sono ottenuti dalla polverizzazione di una particolare roccia dolomitica.

Sono presenti inoltre Ferro (Fe) e Boro (B)

Consentito in agricoltura biologica

Formulazione: Fluido solubile in acqua con densità (kg/dm³) e pH 5,5 (in sospensione acquosa al 10 %).

Caratteristiche: Biomit SR è un prodotto esclusivamente fogliare per la prevenzione delle carenze nutrizionali e degli squilibri fisiologici delle piante.

I suoi componenti favoriscono lo sviluppo vegetativo della pianta, il miglioramento qualitativo del frutto e della sua serbevolezza ed una sensibile riduzione dei trattamenti a base di fitosanitari.

L'uso costante durante il periodo vegetativo ha un effetto protettivo, anche meccanico, nei confronti degli agenti abiotici.

Non contiene solfiti.

Modalità e dosi d'impiego per l'intero periodo di coltura:

Normalmente le irrorazioni con 10 l/ha di Biomit SR vengono alternate a quelle con 5 l/ha

Pomacee e drupacee	50/80 l/ha	Dal rigonfiamento gemme. Importante sono le tre irrorazioni in fioritura (inizio, metà e fine).
Vite	50/90 l/ha	Dall'inizio della ripresa vegetativa
Actinidia	50/80 l/ha	ogni 45 giorni dalla ripresa vegetativa.
Orticoltura	30/40 l/ha	Con irrorazione iniziale su piantine prima del trapianto (vedi pomodoro da industria). Per le brassicacee (cavoli) liliacee (cipolla, aglio e porro) è consigliato l'impiego con un

		prodotto adesivante.
Ulivo	40/50 l/ha	Ogni 45 giorni dalla ripresa vegetativa
Colture industriali: Cereali (frumento, mais, riso ecc.)	25 l/ha	con 5 l/ha su prime foglie aperte, 10 l/ha alla levata tra il primo e secondo nodo e 10 l/ha alla spigatura con spiga già emersa.
Soia	10 l/ha	1 o 2 irrorazioni.
Erba medica	5 l/ha	A metà sviluppo dopo ogni taglio.
Cucurbitacee (melone, zucchine ecc.)	30/40 l/ha	Irrorazione preventiva su piantine prima del trapianto (vedi pomodoro)
Pomodoro	50/80 l/ha	Irrorazione preventiva prima del trapianto con Biomit miscelato con acqua al 5%.. Le irrorazioni devono essere fatte per tutto il periodo vegetativo per mantenere coperti i palchi.

Miscelabilità: Biomit è miscibile con tutti gli antiparassitari di comune uso. L'esclusione dei prodotti contenente alluminio (ad es.: Fosetil alluminio).

Avvertenze: Durante l'irrorazione mantenere sempre in funzione nell'atomizzatore l'impianto di agitazione affinché la parte più solida del prodotto non si depositi.

Pressione di irrorazione minima: 3 atmosfere.

Per i prodotti destinati al consumo fresco e non lavati nel post-raccolta, per evitare che la dolomite lasci sui frutti piccole tracce, interrompere le irrorazioni 20/25 giorni prima della raccolta e/o irrorare con una concentrazione di Biomit SR pari a 1,5%/1,8%.

I tecnici della società sono a disposizione per qualsiasi chiarimento sulle funzioni e l'utilizzo di Biomit.

Confezioni da 10 litri con peso 16 kg.

eco NeoCal 500

CONCIME CE

CORRETTIVO SOSPENSIONE DI CALCARE CON MANGANESE (MN) E ZINCO (ZN)

Contiene:

- 32,5% di Carbonato di Calcio
- 0,5% di Solfato di Manganese
- 1,5% di Solfato di zinco

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA :

Materie prime: sospensione di calcare solo di origine naturale, sale di manganese, sale di zinco

NeoCal500 con la sua elevata concentrazione in Calcio previene tutti i disequilibri fisiologici e nutrizionali di frutta e ortaggi.

NeoCal500 migliora il calibro dei frutti e degli ortaggi, la loro conservabilità e la loro resistenza alla manipolazione. La scelta rigorosa delle materie prime, la loro qualità e la specifica lavorazione di **NeoCal500** ne garantiscono un'elevata efficacia.

POMACEE - Dose : 3-4 L/ha - Concentrazione massima : volume d'acqua minimo 300 L/ha - Epoca: ripetere la applicazioni ogni 7 - 10 giorni dalla caduta petali fino ad un mese prima della raccolta. Prevedere minimo 5 trattamenti.

DRUPACEE - Dose : 5 L/ha - Concentrazione massima : volume d'acqua minimo 500 L/ha - Epoca: fino a 5 applicazioni a partire dall'imbrunimento dello stigma (Gf) ed ogni 10-15 giorni durante la fase di ingrossamento frutto. N.B Se ne sconsiglia l'utilizzo nell'ultimo mese dalla raccolta perché può lasciare una patina bianca su frutti e sulle foglie.

AGRUMI - Dose : 5 L/ha - Concentrazione massima : volume d'acqua minimo 1000 L/ha - Epoca : 3 applicazioni prima della fioritura, subito dopo la fioritura e durante l'ingrossamento del frutto.

VITE (da vino) - Dose : 5 L/ha - Concentrazione massima : volume d'acqua minimo 200 L/ha - Epoca : prevedere minimo 4 trattamenti a 5 L/ha all'allegagione, chiusura grappolo, inizio invaiatura e 15 giorni dopo, dirigere il getto sui grappoli (se ne sconsiglia l'utilizzo su uva da tavola perché può lasciare un deposito)

COLTURE INDUSTRIALI IN PIENO CAMPO (carote...) - Dose : 5 L/ha - Concentrazione massima : volume d'acqua minimo

150 - 200 L/ha - Stade : applicazioni ripetute a partire dalle 4-6 foglie a distanza di 15 giorni.

La forma di carbonato di Ca contenuta in Actiflow Ca560 può lasciare un deposito biancastro sui frutti, quindi evitare l'utilizzo su uva da tavola. Nessun problema sulle mele se vengono lavate dopo la raccolta.

CONSIGLI PRATICI D'USO PREPARAZIONE DELLA MISCELA DI TRATTAMENTO

Per un'efficacia ottimale, utilizzare un volume d'acqua/ha sufficiente per ottenere una bagnatura omogenea sull'insieme dell'apparato vegetativo senza problema di scolo. Si consiglia di effettuare i trattamenti alle temperature comprese tra i 6 e i 25°C.

- Prima di effettuare il trattamento azionare gli agitatori/miscelatori per omogeneizzare la miscela.
- Quando la botte è riempita d'acqua a metà e il sistema di miscelazione è in funzione, versare progressivamente il prodotto.
- Sciacquare l'imballaggio due volte. In caso di miscela con altri prodotti, effettuare sempre un test preventivo e incorporare questo prodotto dopo le formulazioni in polvere.

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 5°C e 40°C. Il prodotto non è combustibile. Non disperdere il contenitore nell'ambiente. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

Non disperdere il contenitore nell'ambiente



Produttore:

GENETTI ECO S.R.L.S. - 01767/16

Via Goldegg 2, 39011 Lana | info@genettieco.com

10KG

NATURETWINE400

„NatureTwine“! Lo spago dalla natura per la natura!

Composizione: Fibre vegetali e viscosi

Colore: Standard: Bianco

Extracolori: Rossi, giallo, verde

Ambiente: 100% dalla natura

100% bio riciclabile

Forza: 400 Newton (ca. 40 kg)

Conferma prova da analisi di laboratorio

Allungamento: Minima

Lunghezza: 715 m / kg

Gomitoli: 5 kg con sviluppo croce da interno svolgibile

4 Gomitoli nel cartone

Imballaggio su bancali monouso 640 kg

Diametro: ca. 1,30mm

Riuso: Se il filo viene piegato o nodato perde di forza

I dati indicate sono dati medi e possono comportare fluttuazioni.

CORROBORANTE

potenziatore delle difese delle piante

Sostanza di origine naturale che migliora la resistenza delle piante agli stress biotici e abiotici

ZEOLITITE a base di CHABASITE (ZEOLITE ITALIANA)

Essiccato e sterilizzato in forno a 200°C per 20'

Polvere di ROCCIA micronizzata con diametro <20 Micron

CARATTERISTICHE GENERALI : Il prodotto aderisce perfettamente alle superfici; la sua micro struttura cristallina cubica rende le superfici particolarmente scabrose rendendole inagibili per insetti e attacchi fungini. Asciugando aumenta la sua capacità igroscopica e facilita la cicatrizzazione di frutta e ortaggi . Non ha tempo di carenza. Ha un elevata capacità di scambio cationico. Protegge le foglie dagli stress da calore e dagli stress da freddo, riducendo l'escursione termica. Il pH è neutro, circa 7.

Trattamenti polverulenti	Indicativamente 6-8 kg per Ha in aggiunta ai Sali rameici o di Zolfo In alternativa, 30 kg di materiale tal quale, per Ha
Orticoltura Frutticoltura	Si impiega a dosi da 2 a 5 kg ogni 500-600 litri di acqua per Ha di terreno. Dal trapianto o dalla post-fioritura ripetere il trattamento ogni 10-15 gg in funzione dell'umidità e delle piogge..
Viticoltura	Trattare il grappolo in fase di invaiatura e oltre con 2-3 interventi (3 Kg./500Lt./Ha) In Floricoltura , trattare 2 volte a settimana (2 Kg./500Lt/Ha)
FERTIRRIGAZIONE a pioggia	Per tutte le colture , associato ad altri fertilizzanti, si impiega a dosi di 3 kg ogni 10000 mq in modo continuativo, da valutare in campo e in opera, con il rivenditore

Autorizzazione non richiesta ai sensi del DM 27/11/2009 N° 18354 e del DPR N° 55 del 28/02/2012.
Non è un fertilizzante nè un fitosanitario.

Conservare in luogo fresco e asciutto , al riparo dalla luce, lontano dal calore e a temperatura compresa fra 5° e 40°C

COMPOSIZIONE MINERALOGICA quali- quantitativa (in % con deviazioni standard) determinata ai Raggi X con metodo Rietveld-RIR (Gualtieri, 2000): **Chabasite** 65 ± 5; **Phillipsite** 5 ± 3; **K-feldspato** 4 ± 2; **Biotite** 2 ± 1; **Pirosseno** 4 ± 1; **vetro vulcanico** 20 ± 5.

Prodotto da VERDI SPA nello stabilimento di lavorazione della zeolite, stabilimento certificato ISO 9001:2008.
Distributore: **Genetti ECO srls**, Goldegstr. 2a - 39011 Lana, info@genettieco.com, www.genettieco.com tel.: 340-0620938
Si declina ogni responsabilità per qualsiasi uso improprio del prodotto. Prodotto per uso agricolo e professionale.

Si consiglia di tenere acceso l'agitatore durante la distribuzione del prodotto per evitare sedimenti




Foto di un microgranulo di Chabasite visto al Microscopio

CLASSIFICAZIONE CLP : IL PRODOTTO NON E' CLASSIFICATO PERICOLO SECONDO LA 1272/2008

IL PRODOTTO NON HA SCADENZA

Sacco da kg 20, peso netto all'origine.

Lotto : GENNAIO 2019

eco TechnoCup6

CONCIME CE

Solfato di rame idrolizzato

Rame (Cu) totale. 6 %

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto.

Non superare le dosi appropriate

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Materie prime: **Solfato di rame**

MISCIBILITA': Non miscelare con prodotti a reazione alcalina. Prima di effettuare miscele con fitofarmaci o concimi, effettuare una prova di compatibilità.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO:

Il prodotto va utilizzato per concimazione foliare.

Culture da frutto (melo, pero, pesco, ciliegio, albicocco, susino)

e vite: utilizzare 1,0-1,4 kg/ha sciolti in 500-700 lt di acqua.

Olivo: utilizzare 1,20-1,80 kg/ha sciolti in 500-700 lt di acqua.

Fragola e colture ortive incluso il finocchio: utilizzare 1,30-1,90 kg/ha diluiti in 500-700 lt di acqua.

Culture di pieno campo (barbabietola, cereali, riso, tabacco): utilizzare 0,70-1,2 kg/ha diluiti in 400-600 lt di acqua

NON EFFETTUARE APPLICAZIONI DURANTE LA FIORITURA.

Il rame, essenziale per la vita di tutte le piante, ha funzioni prevalentemente catalitiche, e il suo ruolo nel metabolismo vegetale è spesso complementare a quello del ferro. E' un elemento polivalente che prende parte attiva ai fenomeni di ossidoriduzione ed è anche un costituente di importanti enzimi come la fenolasi (mono e polifenolossidasi), la laccasi e l'ossidasi dell'acido ascorbico. E' ritenuto necessario anche per la sintesi della clorofilla e contribuisce alla stimolazione delle difese naturali delle piante dai parassiti. La carenza di rame si manifesta con ingiallimenti e formazione di macchie sui lembi fogliari.

PERICOLO

Contiene Idrossido di rame (n. indice 029-02-00-3)

Letale se inalato. Nocivo se ingerito. Provoca gravi lesioni oculari. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Evitare di respirare la polvere. Non disperdere nell'ambiente. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso IN CASO DI INGESTIONE: in presenza di malessere contattare un medico. IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni nazionali.



Verteilen Sie den Behälter nicht in der Umgebung

Produttore:

GENETTI ECO S.R.L.S. - 01767/16

Via Goldegg 2, 39011 Lana | info@genettieco.com

12 LT - 10 KG



Prodotto nuovo per aumentare il grado brix e il contenuto di zuccheri.
Da usare come concime fogliare.
Ideale per tutte le colture: Fragole, lamponi, uva da tavola, pomodoro, mele ecc.

Concime CE

Composizione:

Azoto totale (N) 2%
Azoto organico (N) 2%
Ossido di potassio (K₂O) 7%
solubile in acqua
Sostanza organica 24%

Altre sostanze:

Phenalinin, Methionin, Monosaccharidi e altre sostanze organiche come Alghe e Oxipilini.

Dettagli tecnici:

pH (in 1% di soluzione) 8,1%
peso specifico: 1,33 kg/l

Stimolante naturale per migliorare la maturazione e i gradi brix.

Caratteristiche:

Fruit Red Eco è un prodotto e` basato su alghe del tipo ascofillum nodosum emacrocistis, che vengono dal mare del nord. Queste alghe contengono le sostanze phenylanina, metionina e monosaccaridi. Qui vengono aggiunte altre sostanze vegetali che con cyclopentanone (Oxipine), che attivano il metabolismus della maturazione. Fruit Red Eco porta alla pianta la stanza naturale della biosyntesi metiona, che e` responsabile nella maturazione della crescita della concentrazione

di zuccheri nella frutta (Brix) e la consistenza della frutta senza influenzare l'ostocaggio.

Fruit Red Eco attiva la uniforme maturazione e colorazione della frutta e migliora la resa della raccolta.

Dosi e impiego:

Cultura	Impiego	Dosaggio
Fragole	2 trattamenti a distanza di 8 e 4 giorni dalla raccolta.	4 l /ha
Frutte e frutti noci	2-3 trattamenti a distanza di 7 giorni o un trattamento 7-10 giorni dalla raccolta	3-5 l/ha 6-8 l/ha
Uva e uva da tavola	2 trattamenti 15 e 7 giorni prima della raccolta o un trattamento 7-10 giorni dalla raccolta	3-5 l/ha 6-8 l/ha
Ortaggi all' aperto	2 trattamenti a distanza di 15-7 giorni dalla raccolta.	5 l/ha
Ortaggi in serra	2 trattamenti a distanza di 15-7 giorni dalla raccolta.	4 l/ha
Meloni e angurie	2 trattamenti a distanze di 15 7 giorni dalla raccolta.	3,5 l/ha
Fiori/ornamentali	2 trattamenti a distanza di 8-10 giorni da inizio colorazione fiore.	250-300ml/hl

Miscibilità:

Il prodotto è miscibile con i comuni fitosanitari escluso quelli contenenti rameici, oli minerali e emulsionanti.

Non lasciare il contenitore in giro.

Smaltire in luoghi di ditte specializzate.

Contenuto: 5l

Prodotto da:

Genetti ECO eGmbH, Goldegg 2a, 39011 Lana, +39-340-0620938
info@genettieco.com

FRUIT - RED



PIÙ COLORE



MATURAZIONE
UNIFORME



PIÙ ZUCHERI

Genetti Eco eGMBH

Goldeggstr. 2A - 39011 Lana +39 340 0620938 - E-Mail: info@genettieco.com

eco Kaolin 100

riduce le ustioni da radiazioni solari
riduce il fabbisogno idrico della pianta
impedisce le azioni dannose di insetti, funghi e muffe.

PRODOTTO DI LIBERA VENDITA

BIO

CORROBORANTE E POTENZIATORE DELLE DIFESE NATURALI DELLE PIANTE

Kaolin è un prodotto ad azione disidratante, in quanto ricoprendo il vegetale di una patina che contrasta l'effetto termico, riduce in misura sostanziale il periodo di bagnatura delle superfici vegetali. Il prodotto possiede, inoltre, un effetto fisico indiretto sullo sviluppo di insetti fitofagi e delle patologie fungine.

COMPOSIZIONE:

polvere di roccia 100%.
Prodotto ottenuto tal quale dalla macinazione meccanica di caolino esente da elementi inquinati

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

Irrorare uniformemente la vegetazione con una sospensione acquosa di 2,5-4 kg/hl

Precauzioni d'uso:

Il Plus caolino è un prodotto naturale, innocuo per l'uomo, gli animali e gli insetti utili. Conservare il recipiente ben chiuso in luogo asciutto, fresco ed esente da gelate. Conservare al riparo della luce e a temperature comprese tra 5 °C e 40 °C Conservare lontano dal calore. Il prodotto, in quanto costituito da farina di roccia addizionata ad acqua, è utilizzabile in agricoltura biologica, ai sensi del Regolamento CE 834/2007 e 889/2008

Non disperdere il contenitore nell'ambiente



Produttore:

GENETTI ECO S.R.L.S. - 01767/16

Via Goldegg 2, 39011 Lana | info@genettieco.com

25 KG



Concime CE

Chelato di rame 15%

Utilizzo: Per tutte le colture con carenza di rame. Per un utilizzo curativo agendo sul fogliame appena si manifesta la carenza di rame (da evitare durante la fioritura) applicando 2 – 3 volte un dosaggio di 200- 250 g/hl ad una distanza di 7-10 giorni tra le singole applicazioni finchè la pianta torni allo stato normale. Per un utilizzo preventivo si applica 1 – 2 volte un dosaggio di 100-150 g/hl.

Mela, pera e frutta drupacea: per agevolare la caduta del fogliame e per velocizzare la cicatrizzazione del picciolo delle foglie cadute, dopo la raccolta si applica un dosaggio di 200-300 g/hl e in autunno nelle aziende di ortofrutticoltura un dosaggio di 300-600 g/hl con almeno 1.000-1.500 litri di acqua per ogni ettaro. Il dosaggio varia a seconda del tipo e le condizioni stagionali le quali influiscono sulla caduta naturale delle foglie e quella ritardata. Se necessario ripetere l'applicazione dopo 10-15 giorni.

CARATTERISTICHE DEL RAME (CU), SOLUBILE IN ACQUA: 15% CHELATI TOTALI: 100% DI CUI RAME (CU), CHELATIZZATO CON EDTA: 15%

Conservare in un luogo asciutto e fresco. Non disperdere nell'ambiente il contenitore vuoto.

Produttore:

GENETTI ECO S.R.L.S. - Via Goldegg 2, 39011 Lana | info@genettieco.com

ats kristall90/20



Prodotto azotato con Zolfo (S)

Alto contenuto di Zolfo (90% di SO^3 di cui 40% S). Forte legame tra Azoto ammoniacale e Zolfo che consente una minor perdita per dilavamento e volatilizzazione. Il prodotto ha una forte attività riducente e acidificante liberando lo zolfo nel terreno.

Composizione:

Azoto N 20% (200g w/w)

Di cui: Ammonio solubile in acqua 20%

Anidride solforosa (SO^3) solubile in acqua 90%

Caratteristiche: Alto contenuto di Zolfo (90% di SO^3 , di cui 40% S)

Modalità e dosi di impiego

Culture arboree: (melo pero) come fogliare 2-3 kg/ha prima della fioritura per uso, per uso in fioritura farsi consigliare da un tecnico.

In fertirrigazione alla ripresa vegetativa alla fase di frutto ingrossamento, alla dose di 25-40 kg/ha. Culture orticole allo stadio di 15 cm.

Drupacee prima della fioritura 2-3 kg/ha. Culture industriali: 2-3 l/ha. Su tutte le colture non superare le dosi consigliate e per evitare danni si consiglia di consultare un tecnico.

Miscibilità

Il prodotto è miscibile con i concimi NPK liquidi ed in polvere, evitando quelli con un pH fortemente acido. Si consiglia di effettuare sempre un piccolo saggio per verificare la compatibilità. Da utilizzare soltanto in fabbisogno riconosciuto. Il prodotto non subisce alterazioni immagazzinato alle normali temperature di stoccaggio.

Vantaggio e finalità fisio nutrizionali:

Trasforma e mantiene gli elementi ed i microelementi presenti nel terreno allo stato ridotto rendendoli maggiormente attivi e disponibili per le piante. Lo zolfo libera gli elementi nutritivi presenti nel terreno con la sua azione acidificante da composti insolubili, o da fissazioni chimiche dovute da Ph elevato, contribuendo così a riattivare la capacità di scambio cationica e ad aumentare la fertilità chimica del suolo. Permette di risparmiare l'uso di chelate di ferro e manganese. Abbatte la salinità dei terreni.

20

non disperdere il contenitore nell'ambiente



Produttore

GENETTI ECO S.R.L.S. - 01767/16

Via Goldegg 2, 39011 Lana | info@genettieco.com

10KG



caltop 18



Caltop 18TM

AVVISO

Prima di usare questo prodotto, leggere attentamente tutta l'etichetta

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali

Consentito in agricoltura biologica

Materie prime :cloruro di calcio

CONCIME CE

Soluzione di cloruro di calcio

Analisi garantite:

18% ossido di calcio (CaO) solubile in acqua

Fabbricante: Genetti ECO srls, via goldegg 2a, 39011 Lana + 39 -
340 - 0620938

10 litri

Peso netto
13,27 kg



ATTENZIONE

contiene cloruro di calcio

H319: Provoca grave irritazione oculare.

P280: Fare uso di un dispositivo di protezione degli occhi.

P264: Lavarsi accuratamente le mani dopo l'uso.

P305+351+338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI

OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi

minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è

agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P337+313: Se l'irritazione degli occhi persiste:

Richiedere assistenza medica.

06.12.12

WLIT4051

Caltop 18

DOSI E EPOCHE D'IMPIEGO PER APPLICAZIONI FOGLIARI IN PIENO CAMPO

Actinidia: tre trattamenti a 5 l/ha a partire da 5 giorni dopo la fase di caduta petali e ripetere 30-35 giorni dopo la caduta petali. Volumi d'acqua: 500-1.000 l/ha.

Drupacee (Albicocco, Ciliegio, Nettare, Pesco, Susino): 2 applicazioni di 7-10 l/ha in 500-1.000 l d'acqua (1-2 l/hl) ad intervalli di 10 giorni cominciando 3 settimane prima della raccolta.

Fagiolo: 5 l/ha allo stadio di 4-6 foglie. Ripetere ad intervalli di 10-14 giorni se necessario. Quantità d'acqua: 200 l/ha.

Fragola (Pieno Campo): 3 applicazioni di 7-10 l/ha in 500-1.000 l d'acqua (1-2 l/hl) ad intervalli di 7-14 giorni cominciando all'inizio della fioritura.

Lattuga (Pieno Campo): 5 l/ha in 500-1.000 l d'acqua (0,5-1 l/hl). Applicare all'inizio della stagione della crescita non appena vi sono abbastanza foglie da applicarvi lo spray. Ripetere ad intervalli di 7-14 giorni se necessario.

Pomacee (Melo, Pero): 5-8 applicazioni di 7-10 l/ha in 500-1.000 l d'acqua (1-2 l/hl) ad intervalli di 7-14 giorni cominciando in modo che l'applicazione finale venga eseguita 1 settimana prima della raccolta. Su pero sono sufficienti 2-4 applicazioni.

Pomodoro (Pieno Campo): 5 l/ha alla fioritura del secondo palco. Ripetere ad intervalli di 7-14 giorni. Quantità d'acqua 50-500 l/ha.

Sedano: 5 l/ha in 500-1.000 l d'acqua (0,5-1 l/hl). Applicare all'inizio della stagione della crescita non appena vi sono abbastanza foglie da applicarvi lo spray. Ripetere ad intervalli di 7-14 giorni se necessario.

Vite: 7-10 l/ha. Ripetere ad intervalli di 7-14 giorni a partire dall'allegagione. Volume d'acqua: 500-1.000 l/ha.

DOSI PER APPLICAZIONE FOGLIARE SU COLTURE

PROTETTE Massima concentrazione: 0,5 l/hl.

Massimo volume d'acqua: 1.000 l/ha.

Per le epoche di applicazione fare riferimento alla stessa coltura in pieno campo.

ISTRUZIONI PER L'USO

SEGUIRE SEMPRE LE ISTRUZIONI RIPORTATE SU QUESTE ETICHETTE

Agitare bene il contenitore prima dell'uso. Versare attraverso il filtro superiore nel contenitore, agitando. Riempire con acqua e continuare ad agitare finché la miscela non è pronta.

TANKMIX/MISCELAZIONE

Leggere TUTTE le etichette attentamente e attenersi strettamente alle istruzioni d'uso. La miscelazione è interamente a rischio dell'utilizzatore. Prima di miscelare i prodotti l'utilizzatore o il consulente devono visitare www.tankmix.com per le informazioni importanti. In alternativa, contattare Yara per consigli specifici.

PRECAUZIONI

Da usare su colture protette solo se esplicitamente indicato. Evitare di utilizzare il prodotto in condizioni climatiche estreme, es. condizioni molto asciutte/molto umide, gelate o piogge, previsioni di gelate o piogge. Indossare visiera e guanti protettivi quando si maneggia il prodotto. Pulire tutta l'attrezzatura prima e dopo l'uso.

STOCCAGGIO

Conservare in un deposito per prodotti chimici fresco e asciutto, fuori dalla portata di bambini e animali. Proteggere dalle gelate e da altre condizioni estreme (temperature superiori a 40°C).

È necessario disporre di contenitori e container in accordo con le norme locali, regionali, nazionali e internazionali.

DIAMANT PHOS 96

Trattamento di lusso delle tue piante

DIAMANT- PHOS è il più potente induttore di resistenza delle piante a base di fosfito di potassio in formulazione cristallina. DIAMANT- PHOS nella pianta stimola la produzione di una elevata quantità di sostanze naturali di difesa. Queste sostanze, dette fitoalessine, impediscono ai funghi (phytophthora, bremia, peronospora, maculatura bruna, pythium verticillium ecc) e batteri (pseudomonas ed erwinia) di svilupparsi.

DIAMANT- PHOS manifesta una elevata solubilità e mobilità all'interno della pianta con attività sistemica sia ascendente che discendente e una notevole assimilazione attraverso foglie, rami e radici, ciò ne rende consigliato l'impiego sia per applicazione fogliare che per fertirrigazione.

Può essere impiegato su tutte le colture. Alla dose di 150-250 g/hl (2,5 kg/ha) DIAMANT- PHOS è l'unico fosfito di potassio in formulazione cristallina. Il prodotto con più alto titolo in P₂O₅ (58%) e K₂O (38%) che significa una maggiore disponibilità di ione fosfito (96% di fosfito di potassio) e quindi una maggiore produzione di fitoalessine e protezione delle colture. Ideale per migliorare la lignificazione delle gemme a frutto, la fioritura, l'allegagione, la pezzatura, la colorazione e il grado zuccherino dei frutti.

Ottimo in miscela con fungicidi e chelati in quanto ne aumenta l'efficacia dei

prodotti impiegati Ottimo contro l'essiccazione delle conifere e dei tappeti erbosi

Ottimo per ottenere piante più rigogliose e con una vegetazione di colore

verde intenso Ottimo per ottenere rami e tralci più vigorosi e significati

Ottimo per rin vigorire ogni tipo di coltura debole e stentata

Ottimo in miscela con prodotti di copertura contro oidio, ticchiolatura e alternaria del melo

COLTURE	TRATTAMENTO FOGLIARE g/hl	FERTIRRIGAZIONE kg/ha
FRUTTICOLA Actinidia, Agrumi, Albicocco, Ciliegio, Melo, Noce, Nocciolo, Olivo, Pero, Pesco Ed altre Drupacee, Susino, Vite	150-250	5-10
ORTICOLTURA Cavoli, Cetriolo, Cocomero, Lattughe, Insalate, Cicorie, Pisello, Cipolla, Melanzana, Patata, Peperone, Carciofo, Asparago, Sedano, Pomodoro, Fragola, Zucchini, Fagiolo, Fagiolino, Carota	200-250	1-2/1000 m ²
FLORICOLTURA E VIVAI TAPPETI ERBOSI PRATI SIEPI DI CONIFERE CAMPI DA GOLF	150-250	1-2/1000 m ²
COLTURE INDUSTRIALI Frumento, Mais, Riso, Barbabietola, Soia, Tabacco	150-250	6-7

Prodotto da: Genetti ECO srls - Via Goldegg 2a - 39011 Lana - info@genettieco.com



Boreco 19 - Concime CE

Borato di potassio 19%

Usare solo in fabbisogno

Non superare le dosi indicate.

Caratteristiche:

Boreco 19 è una innovativa altamente solubile formulazione, esente da sali per la carenza e correzione di boro. Questo prodotto aiuta anche se cloruro di sodio o azoto come elementi aggiuntivi.

Al boro possono influenzare negativamente la qualità delle culture sensibili. (Barbabietola da zucchero).

Boreco è un concime in polvere e si può usare al terreno (prima di coltivare) o sul tetto delle foglie nelle culture orticole, viticole, olivicole e arbusticole. Trattamenti convenzionali con bassi volumi sono possibili.

Boro è essenziale nella divisione delle cellule, alle gagione, formazioni di frutti, formazioni di azoti e sintesi di proteine. Riduce la caduta di frutta anticipate, spacchi, frazioni, difformazioni e colorazioni dei frutti.

Boro aumenta la traslocazione dello zucchero e la resistenza della frutta contro maleggiamento, freddo, insetti e immagazzinaggio.

Uso:

Arbusti e frutticoli: 0,5-2 kg/ha

Uva da tavola, olive, piantine di ortaggi sulla foglia.

Vivai, Barbabietola da zucchero, colture industriali sulla foglia 5-5 kg/ha.

Su tutte le altre colture radicali 4-8 kg.

Prodotto da: Genetti ECO srls 01767/16

Via Goldegg 2a, 39011 Lana

info@genettieco.com



BIOFERR-CHEL 9



BIOFERR-CHEL 9 è un innovativo ferro al 9% completamente chelato con una nuova molecola chelante HBED (N,N'-di-(2 Hydroxybenzyl) ethylenediamine-N,N'-Dipropionic acid).

HBED, già registrato come fertilizzante EC, è la molecola chelante più efficace sul Mercato da utilizzare in fertirrigazione e nella applicazioni al suolo per risolvere le carenze di ferro.

Le sue caratteristiche innovative sono:

- 9 % di ferro totalmente disponibile, senza forme isomeriche
- stabile fino a pH 12
- elevata costante di stabilità ($K=10^{-39}$)
- resistente ai raggi UV
- minore affinità con il rame rispetto all'EDDHA
- effetto di lunga durata

BIOFERR-CHEL 9 è un prodotto totalmente nuovo perché, al contrario di quanto avviene con tutti gli agenti chelanti EDDHA, il ferro qui contenuto (9%) è totalmente disponibile perché non dipende dalla percentuale di isomero orto/orto.

Grazie all'elevata concentrazione di ferro, alla stabilità fino a pH molto elevati e alla particolare resistenza ai raggi UV il suo dosaggio può essere sensibilmente ridotto anche in confronto con i più efficaci chelati EDDHA contenenti il 4,5 o il 4,8 % di isomero orto/orto.

BIOFERR-CHEL 9 si presenta in microgranuli di colore marrone solubili in acqua ed è ideale per l'utilizzo in fertirrigazione in particolare in colture a ciclo lungo.

Inoltre la sua ridotta affinità con il Rame rispetto all'EDDHA, evita la sostituzione del ferro da parte del rame mantenendo una elevata disponibilità di ferro anche in aree con elevato contenuto di rame nel suolo con bassi rischi di citotossicità da rame.

Grazie all'effetto di lunga durata può essere sufficiente una sola applicazione. Una seconda applicazione può essere necessaria solo nei casi più estremi.

Prodotto da: Genetti ECO srls

Via Goldegg 2a, 39011 Lana - Tel. +39 340 0620938

info@genettieco.com – www.genettieco.com

Composizione

Ferro (Fe)	Ferro (Fe) chelato con HBED	Agente chelante HBED	Intervallo stabilità agente chelante
9%	9%	HBED	4-12

Dosi e modalità di impiego

Coltura	Kg/Ha	gr/pianta	epoca
Frutticole			
Piante giovani		3-10 gr	1-3 applicazioni-sviluppo vegetativo-primavera-autunno
Piante adulte		10-25 gr	
Agrumi			
Piante giovani		3-15 gr	1-3 applicazioni-sviluppo vegetativo-primavera-autunno
Piante adulte		15-40gr	
Vigneti			
Piante giovani		2-3 gr	A inizio primavera, prima della fase vegetativa, oppure 1 applicazione prima del germogliamento o 1 ai primi sintomi di carenza
Piante adulte		3-12 gr	
Uva da tavola		5-12 gr	
Orticole	5-8 Kg/Ha		1-2 applicazioni-4/6 settimane dopo il trapianto-prima della fioritura
Floricole	5-25 Kg/Ha		1-2 applicazioni-primavera-ai primi sintomi di carenza

Il pH della vasca deve essere superiore a 4

eco Tanneco

34

Sostanza di origine naturale che migliora la resistenza delle piante agli stress biotici e abiotici

Aspetto liquido concentrato marrone scuro
Contenuto in tannino Min. 34% (p/p)
Sostanza secca Min. 46% (p/p)
Materie prime: estratto derivante da legno di castagno.
Prodotto derivante da estrazione con procedimenti f sici.

Funzione agronomica e modalità di azione: esplica un'azione fortificante nella pianta e induce le difese specifiche, ossia ne potenzia il metabolismo ed i meccanismi di autodifesa.

Dosi e modalità d'impiego: da 5-10 litri/ha (500-1000 litri/hl). È consigliato in tutte le fasi fenologiche della pianta ad esclusione della fioritura. Agitare prima dell'uso. Per uso fogliare e radicale. Precauzioni d'uso e avvertenze: non ci sono particolari precauzioni d'uso o controindicazioni, se non il rispetto delle dosi, delle indicazioni e modalità d'uso. Eseguire test preliminari prima dell'uso sulle colture.

Si consiglia di effettuare test preliminari di compatibilità in caso di miscela con altri prodotti.

Il prodotto va conservato nei contenitori originali e consumato entro 2 anni.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Conservare in luogo fresco, asciutto e con l'imballo integro.

Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.

non disperdere il contenitore nell'ambiente



25

Produttore:

GENETTI ECO S.R.L.S. - 01767/16

Via Goldegg 2, 39011 Lana | info@genettieco.com

5KG

SETIVEG

Corroborante

Potenziatore delle difese delle piante

Sostanza di origine naturale che migliora la resistenza delle piante agli stress Biotici ed abiotici.

Oli vegetali alimentari (Olio di soia e cumino)

Composizione:

Olio di soia 50,5% e olio di cumino 3,3% disperse in acqua.

Olio di soia e cumino ottenuto da spremitura a freddo da semi di tali colture.

Dosi di impiego:

Frutticole (Tutte), Vite, Uva da tavola, Agrumi, Olivo: 120-200 ml/hl (min. 1,2 l/ha)

Ortaggi (Tutti), Erbe aromatiche (Tutte) in serra 120-180 ml/hl (min. 1,2 l/ha)

Ortaggi: (tutti), Erbe aromatiche (tutti), in pieno campo: 120-200 ml/hl (min. 1,2 l/ha).

Ornamentali (Tutti): 120-180 ml/hl (min. 1,2 l/ha).

Arboricoltura e Ornamentali in Ambito Urbano e Aree Sensibili: 120-180 ml/hl (min. 1,5 l/ha).

Ripetere a necessità ogni 4/10 giorni in funzione delle esigenze della coltura.

Modalità d'impiego

Deve essere diluito in acqua e nebulizzato uniformemente sulle vegetazioni. Utilizzare Nelle ore più fresche della giornata.

Acidificare la soluzione a pH 4,5/5,0 preferibilmente con acidi organici (citrico, acetico) Impiegare quantità di acqua non inferiore a quelle di seguito indicate: Frutticole: Vite, Uva da tavola, Olivo, Ornamentali: 1500-1750 l/ha Agrumi: 2000-2250 l/ha

Compatibilità e avvertenze Il prodotto è generalmente compatibile con i concimi, insetticidi, acaricidi e fungicidi ad esclusione di prodotti contenenti rame, polisolfuri, prodotti contenenti zolfo. Evitare la miscela con prodotti fortemente acidi (pH sotto 3,0) o alcalini (pH sopra 8,5). Si consiglia comunque di effettuare dei saggi per verificare la

eco
Setiveg

Prodotto da: Genetti ECO s.r.l. | Goldeggstraße 2 | I-39011 Lana (BZ) | info@genettieco.com

compatibilità sulle colture prima di impiego su larga scala. Non superare le dosi consigliate. Applicare i prodotti nelle ore più fresche della giornata. Non applicare in caso di vento. Si raccomanda di lavare bene l'apparecchiatura una volta terminata l'applicazione con acqua ed eventuali detergenti specifici onde evitare l'incrostazione del prodotto che potrebbe otturare gli ugelli.

Conservazione Conservare la confezione in luogo fresco, asciutto e ventilato; non esporre alla luce diretta del sole. Conservare a temperature comprese tra 4 e 35. Chiudere ermeticamente la confezione se parzialmente utilizzata. Non congelare. Da non vendere sfuso. Il contenitore non può essere riutilizzato. In contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Smaltire secondo le norme vigenti.

Olio di semi di cumino nero CAS 90064-32-7

Attenzione

H312 Provoca irritazione cutanea H319 Provoca grave irritazione oculare H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni Per l'uso. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini P262 Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti P264 Lavare le mani accuratamente dopo l'uso. P270 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumento protettivo/Proteggere gli occhi/il viso. P302 + P352 - In caso di contatto con la pelle lavare abbondantemente con acqua e sapone. P305 + P351 + P338 - In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere i eventuali lenti a contatto se è agevole farlo Continuare a sciacquare. P332 + P313 In caso di irritazione della pelle; consultare un medico. P362 - Togliere di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo con la legislazione locale.



Agitare prima dell'uso



1KG

Non disperdere il contenitore nell'ambiente

Tipo di ammendante organico: ammendante vegetale semplice non compostato

Contenuto di micorrize: 1%

Contenuto batteri della rizosfera 10 [8] UFC/gr

Inoculo di funghi micorrizici
Metabas contiene microrganismi per applicazione sull'apparato radicale e nel suolo, inoltre consente anche lo sviluppo di microfori utili come Metarhizium, Beauveria bassiana, e altre specie, che si sviluppano con sostanze proteiche e chitiniche, che sono presenti nei corpi degli insetti, sviluppandosi su questi e producendo spore. Questi microrganismi rispettano gli insetti utili (api).

eco Metabas

Prodotto da: Genetti ECO vGmbH |
Goldeggstraße 2 | I-39011 Lana (BZ) | info@genettieco.com

Prodotto ad azione specifica
Consentito in agricoltura biologica
Fogliare - Radicale
Può essere usato su tutte le colture:
Vite 2-3 kg/ha
Arboree (Pomacee, drupacee, Actinidia, Agrumi ed Olivi) al dosaggio di 2 kg/ha
Orticole da 2,5-3 kg/ha
Cereali da 2,5 a 3 kg/ha
Serra 250-400gr/1000 mq

Applicazioni

Il prodotto deve essere distribuito con una irroratrice al terreno e poi deve essere interrato o con erpici nel caso dei seminatori o con irrigazione nel caso dei frutteti.

Consentito in agricoltura biologica





CONCIME MINERALE SEMPLICE SOLUZIONE DI SALI POTASSICI BTC

Ossido di potassio (K_2O) solubile in acqua.....10 %
a basso tenore di cloro

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 5°C e 40°C. Il prodotto non è combustibile.

CARATTERISTICHE:

CELLFORCE SI è un prodotto a base di silicato di potassio completamente solubile, contiene il 24% di silicio (che è un elemento benefico per le piante) e il 10% di potassio. Promuove l'accrescimento delle piante incrementandone la fotosintesi. Aumenta la resistenza di foglie e steli, riducendo la traspirazione e incrementando l'efficienza di assorbimento dell'acqua e la qualità delle colture.

Formulato specifico raccomandato per l'impiego su terreni con problemi di salinità dovuti alle caratteristiche pedologiche o alla qualità dell'acqua di irrigazione. Riduce a livelli accettabili l'ESP (Percentuale di Sodio Scambiabile) e aumenta la CSC (Capacità di Scambio Cationico). Previene la degradazione del suolo e crea condizioni ottimali per lo sviluppo e l'attività delle radici. Contiene anche 52,5 g/litro di acidi polidrossicarbossilici.

Il silicato di potassio agisce secondo due meccanismi d'azione:

Il primo è meccanico, sulla vegetazione forma una pellicola inorganica che funge da barriera e ostacolo nei confronti degli agenti esterni.

Il secondo meccanismo d'azione, fisiologico, si basa sull'assorbimento del silicio che provoca un indurimento dei tessuti vegetali aumentandone la resistenza agli attacchi esterni.

Per quanto sopra descritto risulta fondamentale l'applicazione preventiva del prodotto al fine di ottenere i migliori risultati.

CELLFORCE SI è una miscela idroalcolica di sali di potassio con silicati.

Il silicato di potassio se utilizzato in abbinamento ad altri prodotti, favorisce la distribuzione omogenea della miscela aiutando ad esercitare una migliore funzione e contribuendo al lavaggio della melata.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

IN APPLICAZIONE FOGLIARE:

Orticole, durante tutto il ciclo.....	150-250 g/hl
Frutticole, in vegetazione	150-250 g/hl
Olivo, in vegetazione.....	150-250 g/hl
Vite, in vegetazione.....	150-250 g/hl

TRATTAMENTI AL BRUNO:

Su tutte le colture, alla dose di.....150-250 g/hl
In caso di presenza di fitofagi , produttori di melata quali psille e afidi, alzare i dosaggi anche fino a 1000 g/hl.

MISCIBILITA':

Evitare l'associazione con calcio e prodotti sistemici. Nelle miscele con olii vegetali non superare 100 cc/hl. E' consigliabile sempre effettuare saggi preliminari, vista l'elevata disponibilità di specie e varietà. Alza il pH delle miscele , per cui da non miscelare con prodotti sensibili all'alcalinità (piretro, rotenone bacillus, Pyros, Show, Lepinox, Rapax, Jack Pot).

AVVERTENZE:

AGITARE PRIMA DELL'USO. Utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Tenere fuori dalla portata dei bambini ed animali. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Non disperdere i vuoti nell'ambiente. Da non vendersi sfuso.

Potassio silicato - CAS 1312-76-1

H315 Provoca irritazione cutanea.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

P262 Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso.

P305/351/338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI

CCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P303/361/353 IN CASO DI CONTATTO CON LA

PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso

immediatamente tutti gli indumenti contaminati.

Sciacquare la pelle/fare una doccia.

Produttore:

GENETTI ECO S.R.L.S.

Via Goldegg 2, 39011 Lana | info@genettieco.com



Bicarbonato di sodio



Bicarbonato di sodio

Sostanza di base secondo regolamento CE 2015/2069

Sistema di base:

Bicarbonato di sodio (natron) in qualità alimentare

Uso del prodotto:

Il prodotto viene sciolto in acqua con le seguenti indicazioni.

Effetto: Fungicida

Impieghi ammessi secondo regolamento

Cultura:	Effetto	Dosi e carenze:
Legumi, piccolo frutti, piante ornamentali	Contro mal bianco (<i>Spaerotheca</i> sp., <i>Oidio</i> spp.)	All'aperto, in serra uso dopo la 2a foglia fino alla raccolta. Numero di Trattamenti: 1-8 trattamenti in Distanza di 10 giorni. Trattare con 333-1000 g di sostanza base su 100 lt. di Acqua (0,33-1,0%) Consumo d'acqua ogni trattamento: 300-600 lt. Quantità indicate: 2-5 kg/ettaro. Carenza: 1 giorno Alcuni colturi sono molto sensibili. La compatibilità Della concentrazione si consiglia testare prima il Trattamento.

Viti (<i>Vitis vinifera</i>)	Mal bianco <i>Uncinula necator</i>	All'aperto uso dopo la 2a foglia fino alla raccolta. Numero di trattamenti: 1-8 trattamenti in Distanza di 10 giorni. Trattare con 420-2000 g di sostanza base in 100 lt. D'acqua (0,42-2,0%) Consumo d'acqua ogni trattamento: 200-600 lt. Quantità indicate: 2,5-5 kg di sostanza di base/ettaro Carenza: 1 giorno. Volumi e dosi d'acqua dipendono dall'altezza delle
--------------------------------	---------------------------------------	---

Colture previste da trattare: Concentrazioni con più`
 Del 1-2 % possono creare delle incompatibilità`
 (phytotossicità`).

Melo	ticchiotura (ventura inequalis)	All` aperto Uso con partenza stadio occhio topo e foglie Verdi Coprano gemme di 10mm, prime foglie si formano Fino alla maturazione e colorazione tipica. Numero di trattamenti: 1-8 trattamenti in Distanza di 10 giorni. Trattare con 500-1000 g di sostanza base in 100 lt Di acqua (0,5-1,0%). Consumo d`acqua: 500-1000 lt/ettaro.  Quantità indicate: 2,5-5 kg di sostanza/ettaro.  Carenza: 1 giorno.  Volumi e dosi d` acqua dipendono dall` altezza delle  Colture previste da trattare: Concentrazioni con del  1% possono creare delle incompatibilità` (fitotossicità`).
Frutti vari (arance, ciliegi, mele, papaya)	Malattie in magazzino Marciume azzurro (<i>penicillium italicum</i>) Marciume verde (<i>penicillium digitatum</i>)	

Prodotto da:

Genetti ECO srls - Via Goldegg 2a - 39011 Lana - info@genettieco.com



CONCIME CE NEO-MAN 500

27,4% (500g/l manganese da carbonato di manganese $MnCo^3$)

Densità: 1,83 kg/l

pH = ca. 6,0

Consigli d'impiego

Generico: per la nutrizione con manganese 1-2 l/ha, concentrazione di 0,2-1.

Da usare come concime fogliare.

Fragle: resa, vitalità, nutrizione con manganese 1-2 volte 1 l/ha. Partenza fioritura alla raccolta.

Mele: più qualità della foglia, nutrizione con manganese di diverse volte con 1 l/ha a partenza frutto nocciolo.

Aumenta il colore verde di base diverse volte, 0,5 l/ha a partenza frutto noce.

Frutti nodi: aumento qualità della foglia con 1 l/ha partenza allegazione.

Vite: ottimizzazione fotosintesi 2-3 volte con 1 l/ha a visibilità primi grappoli.

Legumi: più qualità della foglia e resistenza, colore della foglia 1-2 volte quando c'è abbastanza sostanza verde.

Patate: riduzione ticchiotura 0,5 l/etta alla concia. Miglior qualità della conchiglia e resa: 1-2 volte con 1 l/ha. Partenza una settimana dal prime foglie.

Cereali: più resistenza al freddo, più resa e stabilità: 1-2 volte con 0,5-1 l/ha dallo stadio seconda foglia.

Barbabietola da zucchero: più resa e resistenza: 1-2 volte con 1 l/ha dallo stadio quarta foglia.

Colza: più resa e resistenza: 1-2 volte con 1 l/ha dallo stadio ottava foglia.

Piante mediterranee: 0,5-1%.

Miscibilità

Neo-Man 500 è miscibile con i comuni fitosanitari, poiché possono succedere degli imprevisti meglio fare piccoli test prima di usare il prodotto.

Stoccaggio

nella confezione chiusa e protetta da raggi solari e non sotto -4 °C.

Confezioni: 1-5 litri.

GENETTI ECO
green farming

Produttore: GENETTI ECO S.R.L.S.
Via Goldegg 2, 39011 Lana (BZ)
info@genettieco.com
www.genettieco.com

51



CONCIME CE FRUMAX STAR

MISCELA DI MICROELEMENTI SOLIDA
BORO (B), MANGANESE (Mn) e ZINCO (Zn) (Mg4)

COMPOSIZIONE

Boro (B) solubile in acqua.....	0,1 %
Ferro (Fe) solubile in acqua.....	3 %
Ferro (Fe) chelato con EDTA.....	2 %
Manganese (Mn) solubile in acqua.....	5 %
Zinco (Zn) solubile in acqua.....	5 %
Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua.....	4 %
Agente chelante EDTA	
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: ..2-8	

“Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.”

CARATTERISTICHE

Formulazione polvere solubile a base Magnesio, Boro, Ferro, Manganese e Zinco. Questa composizione è particolarmente indicata per quelle colture particolarmente sensibili alla carenza di Manganese e Zinco ma ben si adatta alla prevenzione ed alla cura della carenza anche degli altri elementi contenuti. **Frumax Star** garantisce una più intensa attività fotosintetica e aumenta la produzione di sostanza secca e carboidrati, incrementando e migliorando la qualità delle produzioni.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

Culture arboree (agrumi, kiwi, drupacee, pomacee, uva da vino e da tavola): in applicazione fogliare dalla ripresa vegetativa alla prima fase dell'accrescimento dei frutti (moltiplicazione cellulare) intervenendo 3-4 volte, alla dose di 3-4 kg/ha

Culture orticole (melanzana, peperone, pomodoro, zucchino, fagiolino, melone, anguria, fragola): in applicazione fogliare durante le prime fasi di crescita e per preparare la pianta alla fioritura 2-3 trattamenti, alla dose di 3 kg/ha

Culture foricole ed ornamentali: in applicazione fogliare durante tutto il ciclo effettuare 2-3 trattamenti, alla dose di 200-250 g/hl. In stati di carenze eccessive, ripetere gli interventi settimanalmente fino al ripristino della normale colorazione delle foglie.



NOVIO



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

MISCIBILITÀ: Il prodotto è miscibile con altri formulati ma si consiglia di effettuare sempre piccoli test per verificare la compatibilità.

AVVERTENZE: La società produttrice risponde solo della composizione del prodotto. Non si assume nessuna responsabilità in caso di danni provocati da un uso improprio del prodotto. Non disperdere il contenitore nell'ambiente. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

S2: CONSERVARE FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI.

R41 RISCHIO DI GRAVI LESIONI OCULARI.

R48/20/22 NOCIVO: PERICOLO DI GRAVI DANNI ALLA SALUTE IN CASO DI ESPOSIZIONE PROLUNGATA PER INALAZIONE E INGESTIONE.

R50/53 ALTAMENTE TOSSICO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI, PUÒ PROVOCARE A LUNGO TERMINE EFFETTI NEGATIVI PER L'AMBIENTE ACQUATICO.

S9 CONSERVARE IL RECIPIENTE IN LUOGO BEN VENTILATO.

S25 EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI.

S26 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI, LAVARE IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE UN MEDICO.

S29 NON GETTARE I RESIDUI NELLE FOGNATURE.

S39 PROTEGGERSI GLI OCCHI/LA FACCIA.

S61 NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE. RIFERIRSI ALLE ISTRUZIONI SPECIALI/ SCHEDE INFORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA.

GENETTI ECO
green farming

Produttore: GENETTI ECO S.R.L.S.
Via Goldegg 2, 39011 Lana (BZ)
info@genettieco.com
www.genettieco.com

Peso netto:
2,5 kg



MICROORGANISMI PER TAPPETO ERBOSO E ORTO

FUNGO-STOP



COMPOSIZIONE

micorrize: glomus intraradices 2 spore/gr.

Batteri della rizosfera: Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus pumilus, Bacillus amyloliquefascies, Bacillus megaterium, Trichoderma 1x108 ufc/g Proteine, Micro e Macro nutrienti.

TAPPETO ERBOSO E ORTO

Prodotto ad azione specifica. Inoculo di funghi micorrizici.

FUNGO-STOP contiene micelio e spore vitali di funghi micorrizici vescicolo-arbuscolari (VAM), spore vitali di microrganismi azotofissatori e solubilizzatori del fosforo in concentrazione minima garantita 1x10⁸ u.f.c./g. I micorrize presenti nel prodotto favoriscono lo sviluppo radicale e un maggiore assorbimento dei macro e dei microelementi. La pianta risulta più vigorosa e riesce a tollerare meglio gli stress termici, gli stress idrici e quelli causati dai patogeni terricoli (Fusarium, Rhizoctonia, Phytophthora, Sclerotinia, Pythium, Thielaviopsis). Si consiglia di applicare il prodotto fin dall'inizio del ciclo colturale.

Prodotto consentito in agricoltura biologica.

Prima di applicare il prodotto versare il contenuto della confezione in un recipiente con acqua e mescolare bene sino a quando non si ottiene una soluzione liquida. Lasciare riposare la soluzione per alcuni minuti, quindi portare la soluzione stessa al volume d'acqua necessario ad eseguire il trattamento. Si consiglia di impiegare la soluzione nell'arco delle 24 ore. Non miscelare con prodotti rameici o a base di zolfo, prodotti a reazione alcalina o prodotti a base oleosa. In caso di miscibilità con altri prodotti si consiglia di svolgere un test di compatibilità.

Dosaggio e modalità di applicazione

tappeto erboso:	durante la fase di irrigazione, si consigliano più applicazioni durante l'intera stagione	150 gr./1.000 m ²
orticole ornamentali	Durante la fase di irrigazione	150 gr./500 m ²
	Durante la fase di irrigazione	150 gr./500 m ²

GENETTI ECO
green farming

Produttore: GENETTI ECO S.R.L.S.
Via Goldegg 2, 39011 Lana (BZ)
info@genettieco.com
www.genettieco.com

150g



POTENZIATORE DELLE DIFESE NATURALI DEI VEGETALI

SAPONE MOLLE



CORROBORANTE SOSTANZA DI ORIGINE NATURALE CHE MIGLIORA LA RESISTENZA DELLE PIANTE AGLI STRESSBIOTICI ED ABIOTICI

Corroborante, potenziatore delle difese naturali dei vegetali. Il sapone molle non ha le caratteristiche né di un fertilizzante né di un fitosanitario ed è soggetto al codice del consumo Dlgs 206/2005 s.m.i. laddove applicabile. Utilizzabile unicamente tal quale.

CARATTERISTICHE:

E' un corroborante a base di sapone di potassio con un elevato potere sgrassante. Il suo utilizzo in serra è raccomandato al fine di eliminare la melata depositata sulla pianta da parte degli insetti. La presenza della melata favorisce l'incubazione e lo sviluppo di funghi patogeni e batteri dannosi per le coltivazioni.

Utilizzato come coadiuvante aumenta l'efficacia dei prodotti insetticidi o dei prodotti naturali.

CONTENUTO DICHIARATO

Soluzione di Sali di potassio contenente il 60% di K

DOSAGGIO E MODALITÀ DI APPLICAZIONE:

Efficace sgrassante: 500 ml. x 100 litri acqua.

Indicazioni di Pericolo:

H 315 Provoca irritazione cutanea.

H 319 Provoca grave irritazione oculare.

Consigli Di Prudenza:

P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P332+P313 In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.

P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P362+P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

Non miscelare con prodotti rameici o a base di zolfo, prodotti a reazione alcalina o prodotti a base oleosa. Il prodotto è utilizzabile su colture orticole, arboree e piante ornamentali. In caso di miscibilità con altri prodotti si consiglia di svolgere un test di compatibilità.

CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO:

Il prodotto si conserva in luogo fresco ed asciutto ad una temperatura tra 5° e 30° gradi.

NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL'AMBIENTE





KIESELGUR

(Diatomacea)

CRYSIL SC

**CONCENTRATO IN SOSPENSIONE
CORROBORANTE E POTENZIATORE DELLA RESISTENZA DELLE PIANTE
POLVERE DI ROCCIA**

Composizione mineralogica: Roccia sedimentaria silicea -

Composizione della miscela per 100 g (60 gr terra di diatomee: 40 H₂O): 45% di SiO₂ + 4% CaCO₃

Caratteristiche:

L'acido silicico favorisce l'irrobustimento delle foglie e degli steli, inoltre la sua composizione, comprendente elementi minerali di primaria importanza, contribuisce a rinforzare la pianta. La polvere silicea esplica, inoltre, azione meccanica (barriera fisica) e, grazie alle sue caratteristiche igroscopiche, può agire come disidratante asciugando la parte esterna dei vegetali e riducendo, in tal modo, i rischi di proliferazione e sviluppo dei parassiti. L'accumulo di silicio nei tessuti dell'epidermide in forma polimerica, organica e cristallina, permette di proteggere e fortificare la meccanica e la biochimica dei tessuti delle piante, inoltre incrementa la resistenza della pianta alla salinità e ne allevia lo stress causato dalla stessa. Il calcio, derivante dal carbonato, migliora il pH del suolo e compete con l'alluminio consentendo, di conseguenza, una più efficace assimilazione dei nutrienti. In caso di suoli salini, il calcio ha un comprovato effetto neutralizzante. Grazie alla tipologia del prodotto, esente da elementi inquinanti, si può tranquillamente utilizzare anche in prossimità del raccolto.

Il prodotto non ha le caratteristiche né di un fertilizzante né di un agro farmaco.

Prodotto previsto nel punto 5) e compreso nell'allegato I del DM 18354 del 27/11/2009 recante disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 s.m.i. riguardanti la produzione biologica.

Prodotto non soggetto ad autorizzazione presso il Ministero della Salute ai sensi del citato DM e del DPR 28/02/2012 n. 55.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO	
APPLICAZIONE FOGLIARE	g/hl
Interventi riposo vegetativo	400-500
Trattamenti vegetativi: serre e macrotunnel	200-300
Trattamenti vegetativi: fruttiferi ed ornamentali	300-350
Trattamenti floricole- ornamentali (utilizzare fino a "bottone verde")	250-300
Forestali	300-400

Responsabile immissione in commercio: BIOYVY SRLS Colletta Francesco, Sede: Via Alcide de Gasperi, 189, P.IVA 06324640827, www.bioyvy.com

Stabilimento di produzione: Los Nogales - San Miguel de Tucuman, Sede: San Martin, 839, Piso: 2° D. San Miguel de Tucuman (3500), Tucuman Repubblica Argentina

Confezione: Tanica da Kg:

5 10 20

KIESELGUR

SCHEDA TECNICA CRYSil (PD) - POLVERE DI DIATOMEE

CORROBORANTE E POTENZIATORE DELLA RESISTENZA DELLE PIANTE

Composizione mineralogica:

Rocchia sedimentaria silicea - Diossido di silicio 75% - Carbonato di calcio 6,8%

Caratteristiche:

L'acido silicico favorisce l'irrobustimento delle foglie e degli steli, inoltre la sua composizione, comprendente elementi minerali di primaria importanza, contribuisce a rinforzare la pianta. La polvere silicea esplica, inoltre, azione meccanica (barriera fisica) e, grazie alle sue caratteristiche igroscopiche, può agire come disidratante asciugando la parte esterna dei vegetali e riducendo, in tal modo, i rischi di proliferazione e sviluppo dei parassiti. L'accumulo di silicio nei tessuti dell'epidermide in forma polimerica, organica e cristallina, permette di proteggere e fortificare la meccanica e la biochimica dei tessuti delle piante, inoltre incrementa la resistenza della pianta alla salinità e ne allevia lo stress causato dalla stessa. Il calcio, derivante dal carbonato, migliora il pH del suolo e compete con l'alluminio consentendo, di conseguenza, una più efficace assimilazione dei nutritivi. In caso di suoli salini, il calcio ha un comprovato effetto neutralizzante. Grazie alla tipologia del prodotto, esente da elementi inquinanti, si può tranquillamente utilizzare anche in prossimità del raccolto.

Il prodotto non ha le caratteristiche né di un fertilizzante né di un agro farmaco.

Prodotto previsto nel punto 5) e compreso nell'allegato I del DM 18354 del 27/11/2009 recante disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 s.m.i. riguardanti la produzione biologica.

Prodotto non soggetto ad autorizzazione presso il Ministero della Salute ai sensi del citato DM e del DPR 28/02/2012 n. 55.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO	
APPLICAZIONE FOGLIARE	
Interventi riposo vegetativo	400-500 g/hl
Trattamenti vegetativi: serre e macrotunnel	200-300 g/hl
Trattamenti vegetativi: fruttiferi ed ornamentali	300-350 hl
Trattamenti floricole- ornamentali (utilizzare fino a "bottone verde")	250-300
Forestali	300-400 g/hl

